

كلية العلوم

القسم : علم الحيوان

السنة : الثانية



٩

المادة : علم البيئة الحيوانية

المحاضرة : الثامنة / نظري / د. سومر

{{{ A to Z مكتبة }}}  
الثانية

Middle East University  
Maktabat A to Z  
Facebook Group : A to Z

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



## خواص الجماعات

درسنا في الفصل السابق تأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية للوسط في الكائنات الحية، ولم يكن هناك ما يمنع من اجراء هذه الدراسات على أفراد معزولة لأن هذه الأفراد تستجيب بالطريقة نفسها إذا كانت تنتمي إلى النوع نفسه وإذا كانت بالطبع في الحالة الفيزيولوجية نفسها.

ولكن في الطبيعة يجب أن لا تأخذ بعين الاعتبار الأفراد فقط وإنما الجماعات التي تنتمي من أفراد تنتمي إلى النوع نفسه، وبالنسبة لكل فرد فإن الأفراد التي تنتمي إلى الجماعة وتحيط به وتشكل جزءاً من محیطه وتؤثر فيه كما هو حال العوامل الأحيائية للوسط، إذا يجب علينا دراسة خواص الجماعات وليس الأفراد وتشكل هذه الدراسة موضوع علم خاص هو علم الديموغرافية Demographie والعوامل التي تتدخل فيه تسمى العوامل الديموغرافية Facteurs demographiques وبإضافة لذلك هناك عوامل السلوك التي تتدخل أيضاً.

وتشكل العوامل الديموغرافية وعوامل السلوك ما يدعى بالعوامل الأحيائية داخل النوع، أي العوامل التي تلعب دوراً ضمن النوع وضمن الجماعات التي يؤلفها ذلك النوع وتحليل هذه العوامل يجعلنا أرقى درجة في تعقيدات الظواهر الطبيعية ومن المستحب أن تتنكر أن العوامل السلوكية تلعب أيضاً دوراً في العلاقة بين الأنواع وأن العوامل الأحيائية تؤثر في الجماعات بالطريقة نفسها التي تؤثر بها في الأفراد المعزولة.

**الجماعة:** هي مجموعة من أفراد النوع الواحد التي تشغّل مكاناً محدداً و هي ذات بنية معقدة ، و تملك جميع الصفات الضرورية للمحافظة على تعدادها.

**خصائص الجماعة:** المقدار – الكثافة و التوزع – البنية الجنسية و العمرية – الولادة و النمو و الموت ....

**الكثافة:** تقدر بكمية المتضييات (عدد، كثافة حيوية، واحدة القدرة) في واحدة المكان.

**الكثافة العددية:** هي متوسط ابتعاد الأفراد عن بعضها البعض، **والكثافة الكتلوية** تعبّر عن تركيز المادة الحية، **والكثافة القدرة** تعبّر عن كمية الطاقة المرتبطة في المتضييات .

وتمتلك الجماعة عدد من الآليات للمحافظة على كثافتها:

١ - **الضبط الذاتي للتعداد:** حسب مبدأ العلاقة العكسيّة مع كمية المصادر الحياتية المحدودة و خاصة الغذاء. عندما يتناقص الغذاء تتحفّض وتيرة النمو، ويرتفع معدل الموت، ويتأخّر البلوغ الجنسي مما يؤدي إلى انخفاض الكثافة. وعندما تتحسن ظروف الحياة يحدث العكس وترتفع الكثافة. و تضبط الكثافة بتغيير وتيرة التكاثر، أو تبدل درجة الخصوبة.

**2 - الهجرة الجماعية للأفراد:** القاعيات النهرية قليلة الحركة تتصعد إلى طبقة الماء ليحملها التيار ، ويرقات القاعيات البحرية تبقى فترة طويلة في طبقة الماء و غالباً ما تحملها التيارات إلى أماكن بعيدة.

**3 - افراز نواتج استقلالية تثبط نمو أفراد النوع نفسه.**

**4 - تأثر كثافة الجماعة و خاصة الجراثيم و الأشنيات و اللافقاريات بمعدل التهامها من قبل الكائنات الأخرى.**

**5 - تحدد كثافة الكائنات الاقتصادية بمعدل صيدها.**

**- البنية الجنسية و التكاثرية:** تتعلق النسبة الجنسية بالصفات الوراثية للنوع، و لكن تتحكم بها ظروف الوسط إلى حد كبير مثل: صغار النوع *Gammarus duebeni* في ظروف اليوم الضوئي الطويل (16 ساعة اضاءة) تتشكل الذكور 3 - 12 مرة أكثر من الإناث. و في اليوم الضوئي القصير (8 ساعات اضاءة) يلاحظ العكس.

تتغير النسبة الجنسية و التكاثرية للجماعات بشكل تكيفي لؤمن الفعالية التكاثرية الازمة في شروط الوسط المتغيرة.

## **2 - العلاقات ضمن الجماعة:**

**أ - الصراع المباشر (السرطانين التاسكين)**

**ب- التنافس:** تجري المنافسة بين أفراد الجماعة على الغذاء عندما يكون محدوداً، و لكن يوجد عدد من التكيفات لخفض هذه المنافسة الغذائية مثل اختلاف الطيف الغذائي عند الحيوانات مختلفة العمر و الجنس و عدم استهلاك الغذاء في نفس الوقت.

**ج- التعاون:** التجمع بشكل أسراب مثل الحيتان و الدلافين.

**د - الخصوع:** مثال القشريات لينات الدرقة فالسراطين الفتية تترك الفريسة لدى اقتراب الأفراد المسنة (طاعة الأكبر).

## **3 - الخصائص الوظيفية للجماعات**

**3 - 1 الخصائص العامة لنمو الأفراد:**

**أ - يمهد النمو السريع للأفراد الفتية لحلول النضج الجنسي المبكر و يقلل الالتهام من قبل المفترسين.** كما أن زيادة كتلة الجسم عند الأفراد الناضجة تومن وتيرة سريعة لخصب الجماعة.

ب - تصرف المصادر الرئيسية للقدرة في المتعضية على النمو البروتيني و زيادة الطول في الفترة السابقة للنضج الجنسي.

ت - إن تغير نمو الأفراد في الجماعة يتبدل بشكل تكيفي حسب درجة تأمين الغذاء و زيادة التغير أثناء الظروف الغذائية السيئة تؤدي إلى توسيع القاعدة الغذائية

ث - تبدي الأجيال المختلفة تأثيراً متبادلاً على نمو الأفراد

3 - 2 - الانتاج الحيوى للجماعة: زيادة الأفراد خلال فترة معينة بغض النظر عن مصير الأفراد نفسها. أو بزيادة الأفراد إضافة إلى المواد المطروحة أثناء حياة المتعضيات (القشور المنبوبة، المخاط المفرز، الافرازات الحاوية على القدرة ... الخ)

## الإنتاج و حرکية الجماعات

الولادة الفيزيولوجية: هي قابلية الجماعة لزيادة و يقدر معدلها بوتيرة ظهور الأفراد الجديدة.

معدل الولادة العظمى: هي الكمية العظمى الممكنة نظرياً من الأفراد الجديدة التي تتشكل في الظروف المثالية.

الولادة البيئية (الواقعية): زيادة الجماعة أثناء ظروف الوسط الواقعية، و تتوقف على مقدار و تركيب الجماعة و الظروف الفيزيائية للوسط.

معدل الولادة المطلقة: عدد الأفراد الجديدة ( $N$ ) بالنسبة لواحدة الزمن  $t$ .

### أنماط التكاثر

أ - التكاثر الجنسي: يحصل عند كثير من وحدات الخلية عندما تسوء الظروف الخارجية مما يؤدي لانخفاض معدل الولادات و ارتفاع الثبات الحيوي للأفراد الجديدة.

ب - التوالي الانحرافي: هو تعاقب الطور البوليبي ذو التكاثر اللاجنسي و الطور الميدوزي ذو التكاثر الجنسي فقط . مثال: معانیات الجوف.

ت - التكاثر الإعاسي: مثال: الاسفنجيات و البريويات.

ث - التوالي المتغغير: هو تعاقب الأجيال الجنسية و البكرية مثال: القشريات الدنيا و الدوارت.

تتغير نسبة الأجيال البكرية و الأجيال ثنائية الجنس تبعاً للظروف الخارجية و خاصة الغذائية و الحرارية. لذا نقسم الأنواع إلى:

1 - الأنواع وحيدة الدورة ذات الجيل الواحد من الذكور في العام.

2 - ثنائيات الدورة: ذات الجيلين.

3 - كثيرة الدورات: ذات أجيال عديدة.

4 - عديمة الدورة: التي تتكاثر بكميات كبيرة بشكل مستمر تقريباً.

#### دورات التكاثر:

**أ - الدورية الفصلية للتکاثر:** يتحدد توقيت أدوار التكاثر مع فصل معين بتغيرات درجة الحرارة بشكل رئيسي. حيث تبدأ الحيوانات تكاثرها مع حلول درجات حرارة معينة التي تكون خاصة و ثابتة بالنسبة لكل نوع. مثال: الكائنات ذات المنشأ الجغرافي المختلف و التي تسكن الموضع نفسه تتكاثر عادة في أوقات مختلفة: أنواع المياه الباردة الموجودة في المياه الدافئة تتكاثر مع حلول الحد الأدنى للحرارة. أما أنواع المياه الدافئة التي تعيش في المياه الباردة تتكاثر عند حلول الحد الأعلى للحرارة.

**ب - الدورية القمرية للتکاثر:** تظهر دورية التكاثر المرتبطة بتعاقب الأطوار القمرية بشكلين: الأول: عندما يحدث التكاثر عدة مرات في الشهر القمري الواحد و لكنه أكثر شدة في بداية الشهر و منتصفه. مثال: الرخويات، متفرعات القرون، كثيرات الأشعار، و شوكيات الجلد التي تسكن المتوسط.

الثاني: عندما يحدث التكاثر مرة واحدة فقط في الشهر القمري. مثال: دودة البالولو تضع بيوضها في الربع القمري الثالث فقط في شهر تشرين الأول أو الثاني من كل عام.

**ت - الدورية اليومية للتکاثر :** إن تبدلات شدة التكاثر الناتجة عن تعاقب الليل و النهار تكون الصفة المميزة لجماعات المتعضيات الصغيرة ذات الدورة الحياتية القصيرة جداً. مثال: يلاحظ الحد الأعلى للانقسام عند الأشنيات البلانكتونية نهاراً. و عند بعض الأشكال سريعة الانقسام شاهد ذروتين: الأولى في الصباح و الثانية بعد الظهر.

تضيع الحشرات المائية بيوضها صباحاً ومساءً. كما تضع بعض مجذفيات الأرجل بيوضها خلال الليل فقط.

**الخصوبة:** هي كمية البيوض أو الأجنة التي تشكلها أفراد الجماعة في واحدة الزمن ولها عدة أنواع:

**الخصوصية الفردية أو الخاصة:** كمية البيوض أو الأجنة التي يشكلها الفرد الواحد.

**الخصوصية المطلقة:** عدد البيوض أو الأجنة التي تشكلها المتعضية خلال الدور التكاثري الواحد.

**الخصوصية النسبية:** نسبة معدل الخصوبة المطلقة للفرد إلى كتلته.

## **أسباب تغير معدل الخصوبة عند الأسماك على بقية الكائنات المائية؟**

- أ - يتزايد معدل الخصوبة مع النمو حتى عمر معين ثم يبدأ بالتناقص عند الأفراد المسنة.**
- ب - ترتبط الطريقة الأساسية لضبط معدل الخصوبة أثناء تغير الامداد بالغذاء بزيادة البيوض عند الأسماك الناضجة بسرعة أكبر و المدخرة للشحوم أكثر .**
- ت - تزداد خصوبة الجماعة نتيجة نضج الأفراد في سن مبكرة.**
- ث - تكون الأنماط التي تعيش في خطوط العرض العليا أقل خصوبة من الموجودة في خطوط العرض الدنيا عند جماعات النوع الواحد و الأنواع ذات صلة القرابة، و يتعلق ذلك بشكل رئيسي بضغط المفترسون الأكبر في خطوط العرض الدنيا.**
- ج - يتناسب معدل الخصوبة عكساً مع حجم الأجنحة المتتشكلة، درجة العناية بالذرية.**

## **معدل الموت والبقاء**

**معدل الموت :** يتراقص تعداد الأفراد في كل جيل نتيجة الموت الطبيعي، الافتراض، وعدم ملائمة الظروف اللاحوية ... الخ ويقدر معدل الموت بعدد الأفراد الميتة خلال فترة معينة أو بالنسبة لواحدة الزمن.

**معدل الموت البيئي أو الحقيقى :** عدد الأفراد الميتة في ظروف الوسط الواقعية.

**معدل الموت الأدنى :** قيمة نظرية ثابتة لعدد الأفراد الميتة في الظروف المثالية عندما لا تتعرض الجماعة لتأثير العوامل البيئية المحددة.

و ينخفض معدل الموت في مراحل النمو المتتابعة بسبب زيادة الوسائل الدفاعية كزيادة الحجم، سرعة الحركة، تشكل البنى الدفاعية ... الخ.

ويرتفع معدل الموت بسبب زيادة عدد المفترسرين، سواء حاد في ظروف الوسط اللاحوية كالحرارة و الملوحة و الأكسجين ... الخ.

ويرتفع معدل بقاء الأجنحة بسبب توفير الظروف التنفسية والحرارية الملائمة، تشكل الأصبغة التنفسية المختلفة، تثبيت لبيوض والأجنحة على جسم الحيوان المتحرك، تشكل تيار مائي حول البيوض.

هذا ويلعب تنظيم سرعة النمو دوراً كبيراً في البقاء وخاصة عند القاعيات لأن تأخر التحول الشكلي لليرقات أيام وأسابيع يحدث عندما لا تجد المكان الملائم للثبت، وينتفيق معدل البقاء إلى حد كبير على طبيعة ووتيرة النمو.