

كلية العلوم

القسم : علم الحيوان


السنة : الرابعة



٩

المادة : علم المناعة والتغذية

المحاضرة : الرابعة/عملي / درس



{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

٤

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



الجلسة العلمية الرابعة

• فحص الدم وتحديد الزمر (الفصائل) الدموية Blood type Testing

فحص الدم وتحديد الزمر (الفصائل) الدموية

- فحص نوع الدم هو اختبار دم بسيط يهدف لتحديد فصيلة الدم للشخص بدقة، بحسب أنواع المستضدات التي تظهر على سطح كريات الدم الحمراء عنده. وهو فحص ضروري قبل التبرع بالدم، وعند النساء الحوامل لتحديد وجود فصيلة دم مختلفة عن تلك التي عند الجنين، وعملية نقل الدم من متبرع إلى مريض.
- ونقل الدم ليست عملية عشوائية، بل لا بد فيها من تتبع خطوات معينة قبل النقل. ولعل أهم هذه الخطوات هي تحديد زمرة الدم لكلٌّ من المتبرع والمتلقي لمعرفة مدى تطابقهما.
- تحمل كريات الدم الحمراء على سطوحها معقدات بروتينية سكرية تدعى (المستضدات أي مولدات الضد) وتعين الزمرة الدموية أساساً من المستضدات في نظامين أساسين هما:

- نظام ABO ونظام الريزوس- Rh -

- في نظام ABO: يوجد نوعان من المستضدات (مولد الضد) هما A و B
بالنسبة لشخص ما، قد تحتوي كرياته الحمراء إما على المستضد A أو B أو كليهما أو قد تغيب المستضدات تماماً، وهذا ما يحدد الزمرة الدموية، فإذا امتلك الشخص مستضداً من نوع A على كرياته الحمراء فإن زمرته الدموية تكون A، وكذلك بالنسبة للنوع B وإذا احتوى دمه كلا المستضدين B و A، فإن زمرته الدموية تكون AB
- أما إذا غابت كل المستضدات عن سطح كرياته الحمراء فإن زمرته الدموية تكون O.

- كما يوجد عامل آخر في بلازما الدم، يرتبط بالمستضد هو الضد وله نوعان هما: الضد Anti-A والضد Anti-B فالشخص الذي زمرته A لديه أضداد من النوع B، أما صاحب الزمرة B فلديه أضداد من النوع B والشخص الذي زمرته AB، فليست لديه أية أضداد في البلازما، بينما يمتلك صاحب الزمرة O كلا النوعين من الأضداد أي Anti-B و Anti-A

الضد في المصل	مولد الضد على سطح الكريات الحمراء	الزمرة الدموية
Anti-B	A	الزمرة A
Anti- A	B	الزمرة B
لا يوجد	معا AB	الزمرة AB
Anti-B و Anti- A معا	O	الزمرة O

- نلاحظ من الجدول عدم اجتماع الضد والمستضد في دم الشخص نفسه أي المستضد Anti-B مع Anti-A أو المستضد A مع A، وذلك لأن الضد يرتبط مع مولده بطريقة نوعية وبمستقبلات محددة الشكل فراغياً.
- كما يؤدي ارتباط الضد الموجود في البلازما مع المستضد الموافق له على سطح الكريات الدموية إلى التفاعل بينهما والتسبب بما يُسمى تراص (تلزن) كريات الدم الحمراء ما يعني فقدانها لوظيفتها.
- والتراص عبارة عن تشكيل تجمعات (تكتل) الكريات الحمراء في العينة مع مصل شفاف اللون يحيط بالكتلة المتجمعة.

نظام الريزووس : Rh :

- هو عبارة عن مستضد بروتيني (مولد ضد) يتواجد عادة على سطح الكريات الحمراء أيضاً وهو موجود لدى معظم البشر.
- في حالة توافر هذا المستضد لدى الشخص فإنه يدعى موجب الريزووس أما في حالة غيابه فإن الشخص يدعى سالب الريزووس
- إذا فإن فحص فصيلة الدم الأكثر شيوعاً يجرى لتحديد الـ ABO, RH على سطح الكريات.
- ويقسم نوع الدم إلى ثمانية مجموعات رئيسية هي:
B-, B+, O+, O-, AB+, AB-, A-,, A+,

حالات إجراء فحص نوع الدم :

- عند التبرع بالدم
- - عند فقدان الدم الحاد
- - لتحديد فصيلة دم الأم الحامل، وتقدير ما إذا كان هناك اختلاف بين نوع دمها ودم الجنين، هذا الاختلاف يمكن أن يسبب حدوث رد فعل مناعي حاد، الأمر الذي من شأنه أن يسبب الإجهاض في الحمل القادم، ويسمى أيضاً عدم توافق زمرة الدم.
- - قبل زراعة الأعضاء وغيرها.

تحديد الزمرة الدموية في المخبر :

- تعتمد طريقة Beth-Vincent لتحديد الزمرة الدموية في المخبر على تحديد المستضدات على سطح كريات الدم الحمراء اعتماداً على مبدأ ارتصاصها باستعمال مصل تجاري مضاد لها. حيث يتم إعداد ثلاثة أوعية صغيرة، يوضع فيها على التوالي الأضداد التالية:
 - المصل التجاري Anti-A -
 - المصل التجاري Anti-B -
 - المصل التجاري Anti-AB -

- ثم نقوم بأخذ عينة صغيرة من دم الشخص المراد معرفة زمرته ووضع قطرة من العينة في كل وعاء على التوالي، مع تحريك الوعاء بهدوء لمدة خمس إلى عشر دقائق ومراقبة ما يحصل.
- في حالة حدوث التراص في الأنابيبين الأول والثالث، فهذا يشير إلى أن الشخص زمرته A وذلك بسبب ارتباط الأضداد Anti-A بالمستضد A في دم الشخص.
- وفي حالة حدوث التراص في الأنابيبين الثاني والثالث فهذا يشير إلى أن الزمرة هي B
- وفي حالة حدوث التراص في الأنابيب الثلاثة الأولى فهذا يشير إلى الزمرة AB
- أما حالة عدم حدوث التراص في أي من الأنابيب الثلاثة فهذا يشير إلى الزمرة الدموية O

Anti-A	Anti-B	Anti-Rh	Blood type
			A^+
			B^+
			AB^+
			O^-

- واعتماداً على نفس المبدأ، يتم اختبار الريزوس وذلك في وعاء رابع حيث تتم إضافة مصل الاختبار الـ Anti-D
- الخاص باختبار الريزوس (Rh) إلى قطرة من الدم مع التحريك.

- فإن حدث التراص يكون الشخص موجب الريزوس بسبب ارتباط الأضداد بالمستضد على سطح الكريات الحمراء
- وفي حالة غياب التراص فإن هذا يدل على أنّ الشخص سالب الريزوس.

الزمرة الدموية	المستضدات المتواعدة	يستطيع أن يستقبل الدم من (أو يستطيع التبرع باللازمـا إلـى)	يستطيع أن يتبرع لـالدم إلـى (أو يستطيع أن يستقبل اللازمـا من)
A ⁺		A ⁺ A ⁻ O ⁺ O ⁻	A ⁺ AB ⁺
A ⁻		A ⁻ O ⁻	A ⁻ A ⁺ AB ⁺ AB ⁻
B ⁺		B ⁺ B ⁻ O ⁺ O ⁻	B ⁺ AB ⁺
B ⁻		B ⁻ O ⁻	B ⁺ B ⁻ AB ⁺ AB ⁻
AB ⁺ (أخذ عـام)		A ⁺ A ⁻ B ⁺ B ⁻ AB ⁺ AB ⁻ O ⁺ O ⁻	AB ⁺
AB ⁻		A ⁻ AB ⁻ O ⁻ B ⁻	AB ⁺ AB ⁻
O ⁺		O ⁺ O ⁻	A ⁺ B ⁺ AB ⁺ O ⁺
O ⁻ (معطـي عـام)		O ⁻	A ⁺ A ⁻ B ⁺ B ⁻ AB ⁺ AB ⁻ O ⁺ O ⁻