



كلية العلوم

القسم : الكيمياء

السنة : الثانية

٩

المادة : اهتزازات وامواج

المحاضرة : الرابعة/نظري/دكتورة

{{{ A to Z مكتبة }}}}

مكتبة A to Z Facebook Group



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



المحاضرة الرابعة لمقرر الاهتزازات والأمواج - د. سمر عمران

تركيب حركتين متعامدتين لهما التواتر نفسه:

تُوصَفُ الحركتان التوافقيتان المركبتان للحركة المحصلة باختيار مناسب للحظة البدء $t = 0$

$$\left. \begin{array}{l} x(t) = A_1 \cos(wt) \\ y(t) = A_2 \cos(wt + \varphi) \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{بالعلاقتين:} \\ (1) \end{array}$$

φ : فرق الطور البدئي .

نحصل على معادلة المسار للحركة المركبة في المستوى oxy بحذف الزمن t .

تُكتَبُ العلاقتين (1) بالشكل التالي:

$$\begin{aligned} \frac{x}{A_1} &= \cos(wt) \\ \frac{y}{A_2} &= \cos(wt) \cos(\varphi) - \sin(wt) \sin(\varphi) \\ \Rightarrow \frac{y}{A_2} &= \frac{x}{A_1} \cos(\varphi) - \sin(wt) \sin(\varphi) \Rightarrow \frac{x}{A_1} \cos(\varphi) - \frac{y}{A_2} = \\ &\quad \sin(wt) \sin(\varphi) \quad (*) \end{aligned}$$

وبتربيع الطرفين وإجراء بعض الإصلاحات بعد تبديل $\sin^2(wt)$ بما يساويها من العلاقة

الأولى:

$$\sin^2(wt) = 1 - \cos^2(wt) = 1 - \left(\frac{x}{A_1}\right)^2 \quad (**) \quad \begin{array}{l} \text{نحصل على العلاقة التالية:} \\ (*) \end{array}$$

$$\left(\frac{x}{A_1}\right)^2 + \left(\frac{y}{A_2}\right)^2 - 2 \left(\frac{x}{A_1}\right) \left(\frac{y}{A_2}\right) \cos(\varphi) - \sin^2(\varphi) = 0 \quad (2)$$

التي تمثل بشكل عام معادلة قطع ناقص تعيين خواصه بقيمة زاوية فرق الطور φ .

إنَّ شكل الحركة المركبة واتجاه الحركة موضح بالشكل التالي، وذلك من أجل قيم مختلفة لزاوية فرق الطور φ هي:

$\varphi = 0,2\pi$ في هذه الحالة تأخذ العلاقة (2) الصيغة التالية:

$$\left(\frac{x}{A_1} - \frac{y}{A_2}\right)^2 = 0 \Rightarrow y = \left(\frac{A_2}{A_1}\right)x \quad (3)$$


والحركة المركبة هي مستقيم ينطبق على قطر المستطيل المحدد للحركة بشكل عام والتي يمر من الربع الأول والثالث للدائرة المثلثية.

تكون الحركة المحصلة في هذه الحالة حركة مستقيمة ويتحدد وضع النقطة المادية على هذا المستقيم بالبعد $s(t)$ الذي يمثل إحداثي هذه الجملة على المستقيم المعرف بالعلاقة (3)، حيث:

$$s(t) = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \cos(wt) \quad (4)$$

أي أنَّ الحركة المركبة في هذه الحالة تمثل حركة توافقية بسيطة أيضاً لها التواتر الزاوي w نفسه وسعتها $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

تصادف هذه الحالة في الاهتزازات الكهربائية وتعطي مفهوماً للضوء المستقطب خطياً.



الشكل (1)

$y = \varphi$ في هذه الحالة نحصل على حركة مركبة تجري وفقاً للمستقيم $y = \left(\frac{A_2}{A_1}\right)x$ - المنطبق على قطر المستطيل المار من الربع الثاني والرابع للدائرة المثلثية، وهي تأخذ شكل حركة تواافقية بسيطة أيضاً ذات تواتر زاوي w وسعة $. A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$

$\varphi = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ (c) في هاتين الحالتين تأخذ العلاقة (2) الصيغة التالية:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad (5)$$

وهي معادلة قطع ناقص تتطبق محاوره على المحورين ox, oy ، أمّا جهة الحركة على هذا القطع فتعين بواسطة الإنشاء الهندسي للمسار، حيث نحدد وضع النقطة P الممثلة للجملة المادية في المستوى oxy في لحظات زمنية متالية.

إنّ تطبيق هذه الطريقة يقود إلى معرفة اتجاه الحركة على القطع الناقص فإذا كانت $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ، فتأخذ معادلتي القطع الوسيطتين الشكل التالي:

$$x(t) = A_1 \cos(wt)$$

$$y(t) = A_2 \cos(wt + \frac{\pi}{2}) = -A_2 \sin wt$$

ففي اللحظة $t = 0$ تكون النقطة p معرفة بالإحداثيين $x = A_1$ و $y = 0$ أي تكون واقعة في الربع الأول وفي لحظة تالية تختلف عن الأولى بفواصل زمني Δt تصبح النقطة p في الربع الرابع لأن إحداثيها x يكون موجب بينما y يكون سالب في هذه اللحظة، ومنه نجد أنّ حركة النقطة p من الوضع الأول إلى الثاني تتجه من الربع الأول إلى الربع أي مع جهة دوران عقارب الساعة. وبنفس الطريقة يمكننا استنتاج أنّ جهة الحركة عندما $\varphi = \frac{3\pi}{2}$ تكون معاكسة لجهة دوران عقارب الساعة. وفي الحالة الخاصة التي يكون فيها $A_2 = A_1$ فإنّ مسار الحركة المركبة يأخذ شكل دائرة بينما لا تتغير جهة الدوران عليه.

(d) $\varphi = \frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$ يبين الإنشاء الهندسي أنّ شكل المسار يأخذ في هذه الحالة شكل قطع ناقص يقع مركزه في مبدأ الإحداثيات 0 ، وينطبق أحد محوريه على المستقيم المعرف بالعلاقة (3) ، أمّا جهة الحركة عليه ف تكون باتجاه عقارب الساعة عندما $\varphi = \frac{\pi}{4}$ ، وعكس اتجاه دوران عقارب الساعة عندما $\varphi = \frac{7\pi}{4}$ ، كما في الشكل (1).

(e) $\varphi = \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ يأخذ المسار في هاتين الحالتين شكل قطع ناقص ينطبق أحد محوريه على المستقيم $x = -y$ ومركزه يقع في مبدأ الإحداثيات أيضاً، أمّا جهة الحركة عليه ف تكون باتجاه عقارب الساعة عندما $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ ، وعكس اتجاه دوران عقارب الساعة عندما $\varphi = \frac{5\pi}{4}$ ، كما في الشكل (1).

من الفقرات السابقة نستنتج أن الحركة المركبة تتعلق بشكل أساسى بفرق الطور φ ، فهى تكون حركة مستقيمة قطرية عندما $0 = \varphi$ بعامل انضغاط يساوى الواحد ثم تتحول إلى حركة على شكل قطع ناقص عندما $\pi < \varphi < 0$ ، أمّا شكل هذا القطع فيتغير بحيث يتلاصص انضغاطه مع ازدياد φ ويبلغ قيمته الصغرى من أجل $\frac{\pi}{2} = \varphi$ ليعود فيزداد مرة أخرى تدريجياً ويبلغ قيمته الواحد عندما $\pi = \varphi$ حيث يتحول القطع الناقص مرة أخرى إلى مستقيم مار من الربع الثاني والرابع.

تحول الحركة المركبة مرة أخرى إلى حركة على شكل قطع ناقص من أجل $2\pi < \varphi < \pi$ ويغير شكل القطع بنفس السياق السابق حيث يتلاصص انضغاطه تدريجياً من الواحد حتى يبلغ قيمته الصغرى عندما $\frac{3\pi}{2} = \varphi$ ثم يزداد من جديد ويبلغ الواحد من أجل $2\pi = \varphi$ حيث يأخذ من جديد شكل المستقيم المعرف بالعلاقة (3).

أمّا جهة الحركة فهى موافقة لاتجاه دوران عقارب الساعة من أجل $\pi < \varphi < 0$ ومعاكسة لاتجاه دوران عقارب الساعة من أجل $2\pi < \varphi < \pi$.

أى أنّ الحركة المركبة من حركتين توافقتين متعامدتين لهما التواتر الزاوي نفسه تمثل حركة على شكل قطع ناقص والعكس صحيح، فالحركة التي لها شكل قطع ناقص يمكن تحليلها إلى حركتين توافقتين بسيطتين متعامدتين ذات تواتر واحد $\frac{2\pi}{T} = w$ حيث T تمثل هنا الزمن اللازم لكي يقوم المتحرك بدورة واحدة على القطع وسعتين مختلفتين، تساوى إدراهما نصف طول أحد ضلعي المستطيل الذي يرسم القطع الناقص داخله بينما تساوى الأخرى نصف طول الضلع الآخر. أمّا زاوية فرق الطور بينهما فتتعدد تبعاً لوضع القطع واتجاه الحركة عليه.

نشير هنا إلى أنّ الحركة الدائرية المنتظمة والتي يمكن تحليلها إلى حركتين توافقتين بسيطتين متعامدتين، لهما تواتر زاوي واحد w مساوٍ للسرعة الزاوية المنتظمة للحركة الدائرية وسعة واحدة تساوى نصف قطر المسار الدائري وفرق الطور ثابت بينهما يساوى $\frac{\pi}{2}$ إذا كانت الحركة باتجاه دوران عقارب الساعة، ويساوي $\frac{3\pi}{2}$ إذا كانت الحركة معاكسة لاتجاه دوران عقارب الساعة.