



كلية العلوم

القسم : علم الحيوان

السنة : الثالثة

1

المادة : كيمياء النسج

المحاضرة : الثامنة/نظري /

A to Z مکتبہ

Facebook Group : A to Z مكتبة



كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

الأحماض النوويية Nucleic Acids

الأحماض النووية هي جسيمات توجد في جميع الخلايا الحية بشكل حر أو متحدة مع البروتينات، ذات وزن جزيئي مرتفع. تتتألف من نيكليوبتيدات عديدة مكونة من (قاعدة نتروجينية (أساس آزوتى) + سكر خماسي + مجموعة فوسفات). الأحماض النووية ليست مسؤولة عن حمل ونقل الصفات الوراثية (التعليمات الجينية) فقط ولكنها تحكم أيضاً في ترجمة هذه التعليمات عند تكوين البروتينات المختلفة في الخلايا. تمت الدراسات الكيميائية الخاصة بالأحماض النووية قديماً اعتماداً على مصدرتين: الأول: هو **الخميره** حيث وجد أنها تحتوي على سكر الريبيوز لذلك سميت بأحماض الريبيو نيوكليلك (RNA)، والثاني: من **الغدة التيموسية بالعجوول** ووجد أنها تحتوي على سكر دي- أوكسي - ريبوز، ولذلك سميت بأحماض الدي - أوكسي - الريبيو نيوكليلك (DNA)، مما أدى إلى الاعتقاد لبعض الوقت بأن الحمض الأول خاص بالنباتات والثاني خاص بالحيوانات، ثم اتضح أن DNA موجود بالنواة وأن RNA موجود في الهيولى، ونتيجة للدراسات الحديثة بطرق التحليل المتطورة أمكن العثور على كميات صغيرة من DNA في الجسيمات الكوندرية والصانعات الخضراء ضمن الهيولى، كما أمكن التعرف على RNA في النواة متصلةً بالنوية.

أنواع الأحماض النووية:

يوجد نوعين من الأحماض النووية هما:

- ✓ **الحمض النووي الريبي (RNA) Ribo nucleic Acid**
- ✓ **الحمض النووي الريبي المنقوص الأكسجين (DNA) Deoxy ribo nucleic Acid**


تركيب (مكونات) الأحماض النووية:

تتألف الأحماض النووية من ثلاثة أنواع من المركبات وهي:


- ✓ حمض الفوسفور
- ✓ سكر خماسي الكربون (اما RNA أو DNA)
- ✓ قواعد نتروجينية (تتبع البيورينات أو البيرimidينات).

القواعد النتروجينية في DNA


يوجد في DNA أربع قواعد نتروجينية (إما من نوع البيورين أو البيرimidين) وهي:



أما في RNA يتم استبدال الثايمين T بـ اليوراسيل U



شكل يوضح هيكل بناء DNA: مكون من حمض الفوسفور
+ سكر خماسي منقوص الأكسجين + قاعدة نتروجينية




مخطط يوضح بناء الأحماض النووية


السكر الخماسي Pentose Sugar

يوجد نوعان من السكاكير الخماسية في الأحماض النووية وهي: الريبيوز ويوجد في RNA، والثاني هو ديووكسي الريبيوز (أو الريبيوز منقوص الأكسجين) ويوجد في DNA. من الخصائص الهاامة للسكر الخماسي هو قدرة المجموعات الهيدروكسيلية على تكوين استرات مع حمض الفوسفور. (انظر الشكل التالي)

ribose
used in RNA



deoxyribose
used in DNA



القواعد النتروجينية

ذكرنا سابقاً أن القواعد النتروجينية إما تتبع (بيورينات أو بيرميدينات)

1) القواعد النتروجينية البيورينية وهي:

(A) Adenine أدينين

(G) Guanine جوانين

2) القواعد النتروجينية البيرميدينية وهي: وهذه القواعد مشتقة من البيورين باستبدال ذرات الهيدروجين


(C) Cytosine سيتوزين

(U) Uracil يوراسييل

(T) Thymine ثايمين

ملاحظة هامة



- يحتوي الحمض النووي DNA على أدينين، جوانين، سيتوزين، ثايمين (A,G,C,T).
- بينما يحتوي الحمض النووي RNA على أدينين، جوانين، سيتوزين، يوراسييل (A,G,C,U).




شكل يوضح كل من القواعد النتروجينية (البيورينية والبيرميدينية)

مجموعة الفوسفات Phosphate group

ترتبط مجموعة الفوسفات بين **مجموعات السكر الخامسة** في سلاسل كل من الحمضين (RNA و DNA). ويلاحظ أن السلسلتين المكونتين للشكل الحزوني في الحمض النووي DNA متوازيتان ولكنهما معكوسان (Anti parallel) والقواعد الآزوتية بهما مزدوجة (Paired) بنظام A مع T و G مع C. وهذا التخصص في الأزواج يعتمد على الروابط الهيدروجينية بين القواعد الآزوتية، فنجد ثلات روابط هيدروجينية لكل زوج G-C ورابطين هيدروجينيين لكل زوج A-T. انظر الشكلين التاليين.



نظام الروابط الهيدروجينية



شكل يوضح الترتيب الذي تسير به القواعد النتروجينية

أنواع الحمض النووي الريبي RNA

يشكل الحمض النووي الريبي RNA بين 5-10% من الوزن الكلي للخلية، وهناك ثلاثة أنواع رئيسية منه وهي:

- الحمض النووي الريبي الرسول (mRNA) Messenger RNA
- الحمض النووي الريبي الريبوزومي (rRNA) Ribosomal RNA
- الحمض النووي الريبي الناقل (tRNA) Transfer RNA

ولكل نوع من الأنواع الثلاثة وزناً جزيئياً وتركيباً خاصاً به من القواعد النتروجينية.

mRNA

يحمل الشيفرة الوراثية من الدNA في النواة إلى السيتوبلازم (المهبل).

تمثل كل ثلاث نكليوتيدات شيفرة وراثية لحمض أميني وتسمى الشيفرة (Codon)

ترجم الشيفرة بعد ذلك إلى أحماض أمينية ثم إلى بروتينات.

لكل بروتين mRNA خاص به، والذي يتحلل بعد تصنيع البروتين.

tRNA

أصغر أنواع RNA، يقوم بنقل الأحماض الأمينية من السيتوبلازم إلى موقع ارتباطها في الريبوزومات حسب تسلسل الشيفرة الوراثية.

يحتوي tRNA على شيفرة مضادة anti codon مكملة للشيفرة الوراثية في الحمض النووي الرسول.

يوجد على الأقل حمض نووي ناقل واحد لكل حمض أميني.

على عكس الحمض النووي الرسول فإن tRNA لا يتحلل بعد تصنيع البروتين.

rRNA

كبير الحجم، ويوجد مرتبطاً ببروتينات نوية (الريبوسوم)

على عكس الرسول فإن rRNA لا يتحلل بعد تصنيع البروتين.