



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الثالثة

المادة : فيزياء احصائية

المحاضرة: الثالثة/نظري / د. علي اسد

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

2026

7

## الفصل الثالث

### مبادئ الفيزياء الإحصائية

#### مدخل في الفيزياء الإحصائية:

قام علم الترموديناميك وهو علم تجريبي بحث بالتعرف على العلاقات الأساسية بين المتحولات الجهرية وتوابع الطاقة اعتماداً على المبادئ الأساسية في الترموديناميك .

إن معرفة معادلة حركة كل جزيء من جزيئات جملة غازية، حتى لو كانت المكونات غاز أحادي الذرة هو المستحيل بعينه، إضافة إلى أن هذا الأمر حتى لو حصل فإنه لن يساعد في معرفة خصائص الجملة الغازية المدروسة ككل. وقد قامت النظرية الحركية للغازات باستنتاج نفس العلاقات التي استنتجها الترموديناميك الكلاسيكي من خلال معرفة خواص الجزيئات ذاتها.

أدت المعرفة المعمقة للخواص الجهرية (الميكروية) للجملة الترموديناميكية إلى ظهور الفيزياء الإحصائية (الميكانيك الإحصائي) الذي يدرس الخواص الجهرية للجملة بدلالة خواصها الجهرية. وتجلت الخواص الجهرية للمادة بدراسة القيمة الوسطى للخاصة الترموديناميكية للغاز كالضغط والحجم ودرجة الحرارة والطاقة.....

وكانت هذه الدراسة (الإحصائية) أعمق وأشمل وأكثر دقة من قوانين الترموديناميك في إيجاد تفصيلات أكثر دقة للجملة لا تستطيع قوانين الترموديناميك الكلاسيكي الحصول عليها.

إذن استطاعت الفيزياء الإحصائية الحصول على نتائج متوافقة مع النتائج التجريبية كما أنها استطاعت التنبؤ ببعض القوانين الهامة التي عجزت عنها قوانين الترموديناميك التقليدي.

وقد أعتبر الغاز الفوتوني (الإشعاع الكهرومغناطيسي داخل وعاء درجة حرارته ثابتة) والغاز الإلكتروني (الإلكترونات الحرة داخل المادة الناقلة) والغاز الفونوني (اهتزاز الذرات في الشبكة البلورية) بمثابة أوساط (جملة غازية) مناسبة لتطبيق الدراسة الإحصائية.

تمكّن الدراسة الإحصائية للجملة الترموديناميكية من التعرف على خواصها الجهرية والمجهرية من خلال الحصول على القوانين المعروفة في علم الترموديناميك (التحريك الحراري) والمستنتجة أساساً من النظرية الحركية للغازات. من هنا نجد سبب تسمية الفيزياء الإحصائية أحياناً بالميكانيك الإحصائي.

#### العالم المجهرى وميكانيك الكم:

سننظر وبعبارة لأهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها ميكانيك الكم:

1- **الطاقة مقدار كم:** اعتبر بلانك أن انتقال الطاقة الإشعاعية لا يكون بشكل مستمر وإنما على شكل دفعات منفصلة، تمثل الدفعة الواحدة فوتون. ويحمل الفوتون الواحد طاقة تتعلق بتواتر الإشعاع  $\nu$  تعطى بالعلاقة:

$$E = nh\nu = n\hbar\omega \quad ; \quad \hbar = h/2\pi \quad \& \quad \omega = 2\pi\nu \quad \& \quad n = 1,2,3,\dots$$

حيث  $h \approx 6,626 \times 10^{-34} \text{ J S}$  ثابتة بلانك. و  $\hbar \approx 1,054 \times 10^{-34} \text{ J S}$  ثابتة ديراك

يمكن فهم هذا المبدأ بالمشابهة مع الشحنة الكهربائية  $Q$  التي لا يمكن أن تكون إلا بأعداد صحيحة من شحنة الإلكترون العنصرية

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ Col} \quad \text{حيث} \quad Q = Ne \quad ; \quad N = 1,2,3,\dots$$

2- **العزم الحركي مقدار كم:** وهو مبدأ اقترحه بور عندما وضع تصوره عن النموذج الذري

$$L = n\hbar \quad ; \quad n = 1,2,3,\dots$$

3- **مفهوم مثنوية (الموجة - جسيم):** اقترح لويس دي برولي (1923-1922) مفهوم الموجة المصاحبة (المرافقة) للجسيم، وقال بأن طولها  $\lambda$  متناسب عكساً مع كمية حركة الجسيم  $P = m\dot{g}$  وأن ثابت التناسب ما هو إلا ثابتة

بلانك المعروفة. وفق العلاقة:

$$\lambda = h/P$$

وقد ضمّن الموجة المصاحبة  $\psi$  مواصفات موجية وجسيمية

فإذا اعتبرنا المواصفات الموجية متمثلة بالعدد الموجي  $k = 2\pi/\lambda$  و التواتر  $\omega = 2\pi\nu$  التي ترتبط ببعضها البعض كما يلي:

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{T} \frac{C}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda} C = Ck$$

يمكن كتابة الموجة المصاحبة ببعد واحد  $\psi(x,t)$  بدلالة المواصفات الموجية بالشكل التالي:

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

وإذا اعتبرنا المواصفات الجسيمية متمثلة بالطاقة  $E$  وكمية الحركة  $p$  التي ترتبط ببعضها البعض كما يلي:

$$E = h\nu = h \frac{C}{\lambda} = CP$$

وترتبط بالمواصفات الموجية بالشكل:

$$\lambda = h/P \Rightarrow P = \frac{h}{\lambda} = \hbar k \quad \text{و} \quad E = \hbar\omega \Rightarrow \omega = E/\hbar$$

يمكن كتابة الموجة المصاحبة ببعد واحد  $\psi(x,t)$  بدلالة المواصفات الجسيمية بالشكل التالي:

$$\psi(x,t) = A e^{\frac{i}{\hbar}(Px - Et)}$$

وقد أكدت تجارب دافيسون وجيرمر و طومسون افتراض دي برولي. وعزز ذلك مبدأ بور المتمم الذي افترض فيه أن الجسيم لا يسلك في تجربة واحدة إلا سلوكاً واحداً (موجي أو جسيمي).

4- مبدأ الشك (عدم اليقين) لـ هايزنبرغ: لا يمكن قياس كميتين فيزيائيتين مترافقتين بدقة كاملة وبوقت واحد.

حيث لا بد من وجود خطأ يفوق بقيمته ثابتة ديراك  $\hbar = h/2\pi$  بالشكل التالي:

$$\Delta x \Delta p \geq \hbar \quad \text{والطاقة والزمن} \quad \Delta E \Delta t \geq \hbar$$

5- معادلة شرودنغر: تستخدم معادلة شرودنغر في إيجاد القيم الخاصة للمقادير الفيزيائية التي يتضمنها تابع الموجة

المصاحبة  $\psi$ . فمن أجل جسيم كتلته  $m$ ، وطاقته الإجمالية  $E$ ، والكامنة  $U$ ، فتكون طاقته الحركية  $E_k = E - U$

نكتب معادلة شرودنغر بالشكل التالي:

$$\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi = 0$$

وهي تكافئ قانون نيوتن الثاني  $F = ma$  في الميكانيك الكلاسيكي

### الفراغ الطوري:

الفراغ الطوري هو مفهوم تجريدي، أبعاده الموضع  $q$ ، والاندفاع (كمية الحركة)  $P$ ، التي تدعى الإحداثيات المعممة. وبدلالة المساقط: نحصل على ستة مساقط ثلاثة منها للموضع وثلاثة للدفع.

$$\Gamma \equiv (q, P) \Leftrightarrow \underbrace{(x, y, z, P_x, P_y, P_z)}_q$$

وكما هو واضح فإن هذا الفراغ سداسي البعد، الأمر الذي لا يمكننا تصوره.

• لمزيد من الفهم، نفرض للسهولة هزاز (متذبذب توافقي) يتحرك ببعد واحد  $x$ ، بكمية حركة  $P_x = m\dot{x}$ .

وبمرور الزمن سيرسم المتحرك في المستوي  $(x, P_x)$  الذي ندعوه فراغ الطور  $\Gamma(x, P_x)$  مساراً محدد يدعى المسار

الطوري، وكل نقطة من هذا المسار تدعى نقطة طورية.

فإذا كانت الحركة التوافقية للمتذبذب تتم دون احتكاك، فإن طاقته الإجمالية تبقى

ثابتة في أي لحظة زمنية (عند كل إزاحة  $x$  عن وضع التوازن). وهي عبارة عن مجموع طاقتيه الحركية  $m\dot{x}^2/2$  والكامنة  $k_s x^2/2$ ، حيث  $k_s$  ثابت الإرجاع.

$$E = P_x^2 / 2m + k_s x^2 / 2 = cte$$

وبقسمة الطرفين على  $E$ :

$$\frac{P_x^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/k_s} = 1$$

وهي معادلة قطع ناقص في المستوي  $(x, P_x)$ ، الممثل لفراغ الطور، نصف قطره الكبير  $\sqrt{2E/k_s}$ ، والصغير  $\sqrt{2mE}$ .


كما بالشكل ( ). هذا ويمكن رسم مسار مغلق مشابه عند كل قيمة محددة لطاقة الهزاز (المتذبذب)، بحيث لا تتقاطع

هذه المسارات مع بعضها البعض.

نوجد وحدة قياس حجم (مساحة) هذا الفراغ من العلاقة البعدية لجداء بُعديه


$$[x, P_x] = [xm\dot{x}] = mkg \frac{m}{S} = m \frac{kgm}{S} \frac{S}{S} = m \frac{kgm}{S^2} S = mNS = JS = [\hbar]$$

نستنتج مما سبق أن وحدة قياس حجم (مساحة) الفراغ الطوري تساوي وحدة قياس ثابتة بلانك  $h$  (ديراك  $\hbar$ ).



شكل ( )

نفرض أن قيمة  $\hbar$  مساوية لقيمة عنصر الحجم (المساحة) في هذا الفراغ (الخلية الطورية)  $\Delta\Gamma$ ، كما في الشكل ( ). فتكون القيمة العددية للخطأ المرتكب في أي قياس يجري ضمن هذا الفراغ أكبر أو يساوي نصف أصغر تدریجة ( $\hbar/2$ )، أي من رتبة قياس الخلية الطورية  $\hbar$ . وهذا يتطابق مع مبدأ الشك لـ هايزنبرغ  $\Delta\Gamma = \Delta x \Delta P_x \geq \hbar$ .



شكل ( )

• بالمشابهة: إذا فرضنا أن حركة الهزاز تتم بثلاثة أبعاد  $(x, y, z)$  نحصل على فراغ طوري  $\Gamma(q, P)$  على شكل مجسم لسطح مغلق. وكل نقطة منه تدعى نقطة طورية، والانتقال من نقطة لأخرى على نفس السطح يدعى المسار الطوري.

وانسجماً مع مبدأ الشك لـ هايزنبرغ تكون القيمة العددية للخطأ المرتكب في أي قياس يجري ضمن هذا الفراغ

$$\Delta\Gamma = \Delta q \cdot \Delta P = \underbrace{\Delta x \Delta y \Delta z}_{\Delta q} \underbrace{\Delta P_x \Delta P_y \Delta P_z}_{\Delta P} \geq \hbar^3$$

وبملاحظة صغر قيمة المقدار  $\hbar^3 \sim 10^{-102}$  نستنتج أن قيمة عنصر حجم الفراغ الطوري  $\Delta\Gamma(\Delta q, \Delta P)$  لهزاز واحد يتحرك بثلاثة أبعاد  $(x, y, z)$  صغيرة جداً.

• بالتعميم على N هزاز نجد:

$$\begin{aligned} \Delta\Gamma &= \Delta q_1 \cdot \Delta q_2 \cdot \Delta q_3 \dots \Delta q_N \cdot \Delta P_1 \cdot \Delta P_2 \cdot \Delta P_3 \dots \Delta P_N \\ &= \underbrace{\Delta x_1 \cdot \Delta y_1 \cdot \Delta z_1}_{\Delta q_1} \cdot \underbrace{\Delta x_2 \cdot \Delta y_2 \cdot \Delta z_2}_{\Delta q_2} \dots \underbrace{\Delta x_N \cdot \Delta y_N \cdot \Delta z_N}_{\Delta q_N} \cdot \underbrace{\Delta P_{x_1} \cdot \Delta P_{y_1} \cdot \Delta P_{z_1}}_{\Delta P_1} \cdot \underbrace{\Delta P_{x_2} \cdot \Delta P_{y_2} \cdot \Delta P_{z_2}}_{\Delta P_2} \dots \underbrace{\Delta P_{x_N} \cdot \Delta P_{y_N} \cdot \Delta P_{z_N}}_{\Delta P_N} \geq \hbar^{3N} \end{aligned}$$

### عنصر فراغ الاندفاع الطوري:

بما أن الفراغ الطوري  $\Gamma(q, P)$  معطى بدلالة إحداثيي الموضع  $q$  والاندفاع  $P$  المعممين. فإن عنصر حجم الفراغ الطوري  $d\Gamma$  سيكون بدلالة عنصري الحجم  $dq_v$  و  $dP_v$  (الخاصين بالموضع والاندفاع على الترتيب)، بالشكل:

$$d\Gamma = dq_v \cdot dP_v \quad (1)$$

نفرض للسهولة أن عنصر الحجم الخاص بالموضع مساوياً للحجم  $dq_v = V$  لأنه يمثل جداءات لعناصر الموضع. كما نأخذ عنصر الحجم الخاص بالاندفاع مساوياً لعنصر حجم الكرة التي نصف قطرها الاندفاع  $P$  ذاته كما يلي:

$$dP_v = d\left(\frac{4}{3}\pi P^3\right) = 4\pi P^2 dP$$

بالتعويض في (1) عن كلٍ بقيمته نحصل على عنصر فراغ الاندفاع الطوري:

$$\boxed{d\Gamma(P) = 4\pi V P^2 dP} \quad (2)$$

### عنصر فراغ السرعة الطوري:

نجد من علاقة كمية الحركة بالسرعة حسب العلاقة:

$$P = m\vartheta \Rightarrow dP = m d\vartheta$$

وبالتعويض في (2) عن كلٍ بقيمته نحصل على عنصر فراغ السرعة الطوري:

$$\boxed{d\Gamma(\vartheta) = 4\pi V m^3 \vartheta^2 d\vartheta} \quad (3)$$

### عنصر فراغ الطاقة الطوري:

نجد من عبارة الطاقة الحركية (باعتبار أن الطاقة الإجمالية للجسيم المدروس هي طاقة حركية فقط).

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m \vartheta^2 = \frac{P^2}{2m} \quad (*)$$

وكما هو واضح يمكن إيجاده بالتعويض عن قيمة الاندفاع من (\*) في (2) كما يلي:

$$P^2 = 2m\varepsilon \Rightarrow P = \sqrt{2m\varepsilon} \Rightarrow dP = \frac{m d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}$$

وبالتعويض في (2) نحصل على عنصر فراغ الطاقة الطوري:

$$d\Gamma(\varepsilon) = 4\pi V 2m\varepsilon \frac{m d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}} = 2\pi V \sqrt{2m} \sqrt{\varepsilon} 2m d\varepsilon$$

$$\boxed{d\Gamma(\varepsilon) = 2\pi V (2m)^{3/2} (\varepsilon)^{1/2} d\varepsilon} \quad (4)$$

وبنفس الأسلوب يمكن للطالب الحصول على (4) بالتعويض عن قيمة السرعة من (\*) في (3) كما يلي:

$$g^2 = \frac{2\varepsilon}{m} \Rightarrow g = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}} \Rightarrow dg = \frac{2/m}{2\sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}} d\varepsilon = \frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}$$

ملاحظة: يمكن التأكد من وحدة قياس عنصر فراغ الطاقة الطوري كما يلي:

$$[\Gamma(\varepsilon)] = [V \cdot m^{3/2} \cdot \varepsilon^{3/2}] = m^3 (kg)^{3/2} J^{3/2} = m^3 (kg)^{3/2} \left( \frac{kgm^2}{S^2} \right)^{3/2}$$

$$= \frac{kg^3 m^6}{S^3} \left( \frac{S^3}{S^3} \right) = \frac{kg^3 m^6}{S^6} S^3 = \left( \frac{kg m^2}{S^2} S \right)^3 = (Nm S)^3 = (JS)^3 = [\hbar^3]$$


### درجة التحلل (كثافة تنضد سويات الطاقة):

يفيد الميكانيك الكمي أن تبادل الطاقة يكون على شكل كمات (دفعات متقطعة) من الطاقة، قيمة كل منها تساوي الفرق

$$\Delta E = h\nu = \hbar\omega \text{ بين قيمتي سويتي الطاقة اللتين ينتقل الجسيم بينهما.}$$

وأن سويات الطاقة  $\varepsilon_n$  متحللة من أجل الأعداد الكمية  $n \geq 2$  حيث:

$n = 1, 2, 3, \dots$  كما يلي إلى:



شكل ( )

$$\underbrace{S}_{n=1}, \underbrace{S, P}_{n=2}, \underbrace{S, P, d}_{n=3}, \underbrace{S, P, d, e}_{n=4}, \dots$$

يوضح الشكل ( ) تنضد سويات الطاقة  $\varepsilon_n$  ، ودرجات التحلل  $g(\varepsilon_n)$

الموافقة لها على شكل خلايا (حجرات منفصلة).

لإيجاد عبارة درجة التحلل (كثافة تنضد سويات الطاقة)، نستعرض وبعبارة معطيات ميكانيك الكم في هذا المجال: نطبق معادلة شرودنغر التالية:

$$\nabla_x^2 \psi_n(x) + \frac{2m}{\hbar^2} (\varepsilon_n - U) \psi_n(x) = 0 \quad ; \quad \nabla_x^2 = \frac{d^2}{dx^2}$$

على جسيم يتحرك بعيد واحد  $x$  في بئر طاقة كموني (عرضه  $L$  ، ولانهائي العمق) وموصوف بالعلاقة:

$$U(x) = \begin{cases} 0 & ; 0 \leq x \leq L \\ \infty & ; L < x < 0 \end{cases}$$

فتصبح معادلة شرودنغر داخل البئر بالشكل:

$$\nabla_x^2 \psi_n(x) + \frac{2m\varepsilon_n}{\hbar^2} \psi_n(x) = 0$$

التي نكتبها بدلالة العدد الموجي

$$\text{بالشكل: } k_n = \sqrt{\frac{2m\varepsilon_n}{\hbar^2}} \equiv \frac{2\pi}{\lambda_n} \quad (*)$$

$$\nabla_x^2 \psi_n(x) + k_n^2 \psi_n(x) = 0$$

وكما هو معلوم هي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية بالنسبة للمتحول  $x$  وتقبل حلاً أسياً (جيبياً) من الشكل:

$$\psi_n(x) = A \sin k_n x + B \cos k_n x$$

وبتطبيق الشروط الحدية على التابع الموجي  $\psi_n(x)$


$$\psi_n(x=0) = 0 \Rightarrow \cos k_n x \neq 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\psi_n(x=L) = 0 \Rightarrow A \sin k_n L = 0 \Leftrightarrow k_n L = n\pi \Rightarrow \boxed{k_n = n\pi/L} \quad (**)$$

وهذا يعني تشكل أمواج مستقرة في المجال  $x \in [0-L]$  (لأن شرط الحصول على عُقد عند طرفي المجال أن يكون

فرق الطور  $\varphi = k_n L = n\pi$  وبالتالي يكون:  $k_n = \frac{n\pi}{L}$  . ويصبح الحل على النحو:  $\psi_n(x) = A \sin \frac{n\pi}{L} x$

نحصل على سعة التابع الموجي  $\psi_n(x)$  من الشرط الواحدي التالي:



$$|\psi_n(x)|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n^*(x) \psi_n(x) dx = 1 \Rightarrow A = \sqrt{2/L}$$

وبالتعويض نحصل على صيغة التابع الموجي  $\psi_n(x)$  بالشكل:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi}{L} x$$

يوضح الشكل ( ) الأمواج المستقرة  $\psi_n(x)$  داخل البئر

الكموني من أجل القيم المختلفة للعدد الكمي  $n$ .

للحصول على سويات الطاقة  $\epsilon_n$  الموافقة نسائي بين عبارتي

العدد الموجي في (\*) و (\*\*)، فنجد بعد التربيع:

$$\frac{n^2 \pi^2}{L^2} = \frac{2m\epsilon_n}{\hbar^2} \Rightarrow \boxed{\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2}$$

فمن أجل  $n=1$  نحصل على مستوى الطاقة الأرضي  $\epsilon_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$

ومن أجل  $n=2$  نحصل على مستوى الطاقة الأول  $\epsilon_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = 4\epsilon_0$  وهكذا.....

- ومن أجل جسيم يتحرك في ثلاثة أبعاد  $(x, y, z)$  داخل بئر كموني على شكل صندوق أبعاده  $L_x$  و  $L_y$  و  $L_z$ . يمكن تشبيه هذه الحالة بحركة إلكترون حر داخل قطعة معدنية مكعبة الشكل، فيبقى حبيساً داخلها (لا يمكنه الإفلات أو الهرب)، وذلك نظراً لوجود قوى سطحية في المعدن تفوق الطاقة الحركية للإلكترون. نلاحظ توزيع الأمواج المستقرة على الأبعاد الثلاثة داخل البئر (الصندوق) كما هو موضح بالشكل ( ).

وتصبح عبارة سويات الطاقة  $\epsilon_n$  بالشكل التالي:

$$\epsilon_n = \epsilon_{n_x} + \epsilon_{n_y} + \epsilon_{n_z} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL_x^2} n_x^2 + \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL_y^2} n_y^2 + \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL_z^2} n_z^2$$

$$\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2m} \left( \frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right) ; \{n_x, n_y, n_z\} = 1, 2, 3, \dots$$

ومن أجل صندوق مكعب الشكل  $(L_x = L_y = L_z = L)$  نجد:

$$\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

يمكن كتابة عبارة سويات الطاقة  $\epsilon_n$  بدلالة حجم المكعب الصندوقي  $V = L^3 \Leftrightarrow L = V^{1/3} \Leftrightarrow L^2 = V^{2/3}$  بالشكل التالي:

$$\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

وبدلالة عدد الكم الرئيسي  $n$  لهذا الجسيم (الذي يساوي الجذر التربيعي لمجموع مربعات مساقطه  $\{n_x, n_y, n_z\}$  على المحاور الإحداثية)، تصبح العبارة السابقة بالشكل التالي:

$$\boxed{\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} n^2 ; n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \Leftrightarrow n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}}$$

وكما هو ملاحظ: فإنه من أجل سوية طاقة محددة  $\epsilon_n$  يمكن أن يكون مربع عدد الكم الرئيسي  $n^2$  (لهذا الجسيم) ناتجاً عن توزيعات مختلفة لمساقطه على المحاور.

فمثلاً من أجل الحالة الأرضية  $\varepsilon_0$  (عندما لا يكون أي من المساقط في حالة إثارة)  $\{n_x = n_y = n_z = 1\}$  يأخذ مربع

$$\text{عدد الكم الرئيسي القيمة } n^2 = 3, \text{ وطاقة الجسيم في السوية الأرضية } \varepsilon_g = 3 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} = 3\varepsilon_0, \text{ ونحتاج في هذه}$$

الحالة لتابع موجي وحيد  $\{\psi_{(n_x, n_y, n_z)} \equiv \psi_{(1,1,1)}\}$  لتمثيل حركة الجسيم في المستوى الأرضي. ونقول عن السوية

الأرضية أنها غير متحللة، لأن درجة تحللها  $g(\varepsilon_0) = 1$ ، (بعدد التوابع الموجية اللازمة لتمثيل حركة الجسيم).

ومن أجل السوية المثارة الأولى (عندما يكون أحد المساقط مثاراً ويأخذ القيمة 2) نلاحظ وجود ثلاث حالات ممكنة

$\{(2,1,1), (1,2,1), (1,1,2)\}$  التي يكون فيها لمربع عدد الكم الرئيسي القيمة  $n^2 = 6$ ، وطاقة الجسيم في السوية المثارة

$$\text{الأولى } \varepsilon_1 = 6 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} = 6\varepsilon_0, \text{ ونحتاج في هذه الحالة لثلاث توابع موجية } \{\psi_{(2,1,1)}, \psi_{(1,2,1)}, \psi_{(1,1,2)}\} \text{ لتمثيل}$$

حركة الجسيم في السوية المثارة الأولى. ونقول عن السوية المثارة الأولى أنها متحللة، لأن درجة تحللها  $g(\varepsilon_1) = 3$ ، (بعدد التوابع الموجية اللازمة لتمثيل حركة الجسيم).

ومن أجل السوية المثارة الثانية (عندما يوجد مسقطين مثارين وكل منهما يأخذ القيمة 2)، نلاحظ وجود ثلاث حالات

ممكنة  $\{(1,2,2), (2,1,2), (2,2,1)\}$  التي يكون فيها لمربع عدد الكم الرئيسي القيمة  $n^2 = 9$ ، وطاقة الجسيم في السوية

$$\text{المثارة الثانية } \varepsilon_2 = 9 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} = 9\varepsilon_0, \text{ ونحتاج في هذه الحالة لثلاث توابع موجية } \{\psi_{(1,2,2)}, \psi_{(2,1,2)}, \psi_{(2,2,1)}\}$$

لتمثيل حركة الجسيم في السوية المثارة الثانية. ونقول عن السوية المثارة الثانية أنها متحللة، لأن درجة تحللها

$g(\varepsilon_2) = 3$ ، (بعدد التوابع الموجية اللازمة لتمثيل حركة الجسيم).

وهكذا بالنسبة للسويات المثارة الثالثة، والرابعة، ....، كما هو موضح في الجدول التالي:

المستوى	توزع $(n_x, n_y, n_z)$	مربع العدد الكمي الرئيسي $n^2$	طاقة المستوى $\varepsilon_n$	درجة تحلل المستوى $g(\varepsilon_n)$
الأرضي	(1,1,1)	3	$\varepsilon_g = 3\varepsilon_0$	1
المثار الأول	(2,1,1) (1,2,1) (1,1,2)	6	$\varepsilon_1 = 6\varepsilon_0$	3
المثار الثاني	(1,2,2) (2,1,2) (2,2,1)	9	$\varepsilon_2 = 9\varepsilon_0$	3
المثار الثالث	(2,2,2)	12	$\varepsilon_3 = 12\varepsilon_0$	1
المثار الرابع	(1,2,3) (2,1,3) (1,3,2) (3,2,1) (3,1,2) (2,3,1)	14	$\varepsilon_4 = 14\varepsilon_0$	6

نستنتج مما سبق أنه يمكن تعريف درجة التحلل  $g(\varepsilon_n)$  بأنها عدد حالات التوزع الممكنة التي يكون فيها للجسيم نفس

الطاقة. أو (بعدد التوابع اللازمة للوصف  $\psi(\varepsilon_n)$ )

تأثير حجم المكعب الصندوقي على تنضد القيم المميزة لطاقة الجسيم المحصور داخله:


$$\text{يلاحظ من العبارة } \varepsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} n^2 \text{ أن الطاقة والحجم متناسبان عكسياً. فزيادة الحجم تؤدي لتناقص قيم } \varepsilon_n \text{ مما}$$

يشير لتقلص المسافات الفاصلة بين هذه السويات وبالتالي زيادة تراصها (تصبح كثافة التنضد عالية) حيث نتعامل في

هذه الحالة مع الأطياف المنفصلة للطاقات العالية على أنها أطياف مستمرة ونستعيز عن عبارة المجموع  $\sum$

بعبارة التكامل  $\int$  (و تُدرس الجملة كلاسيكياً). أما في الحالة المعاكسة فنحصل على تباعد بين السويات (و تُدرس

الجملة كمياً)، كما هو موضح بالشكل ( ).



مثال: احسب العدد الكمي الرئيسي الموافق لرقم تنضد السوية  $\epsilon_n$   
 لذرة غاز الهيليوم  $He$  عند وضع كمية منه  $m_{He} = 6,65 \times 10^{-27} \text{ kg}$   
 عند درجة حرارة الغرفة  $T = 293 \text{ K}$  في حجوم مختلفة:  
 $V = 1 \text{ mm}^3 = 10^{-9} \text{ m}^3$  ،  $V = 1 \text{ lit} = 10^{-3} \text{ m}^3$  ،  $V = 1 \text{ m}^3$   
 الحل: نحسب الطاقة الحركية للجزيئ من النظرية الحركية للغازات  
 $\epsilon = 3KT/2 = 3 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 293/2 = 6 \times 10^{-21} \text{ J}$   
 وهي كما هو واضح طاقة عالية.  
 نوجد عدد الكم الرئيسي الموافق لهذه الطاقة من العلاقة:

$$\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} n^2 \Rightarrow n^2 = \frac{8m}{h^2} \epsilon_n V^{2/3} = \frac{8 \times 6,65 \times 10^{-27}}{(6,63 \times 10^{-34})^2} \times 6 \times 10^{-21} \times V^{2/3} \approx 10^{20} \times V^{2/3} \Rightarrow n \approx 10^{10} \times V^{1/3}$$

ومن أجل الحجوم المختلفة

$$\text{عندما } V = 1 \text{ m}^3 \Rightarrow n \approx 10^{10}$$

$$\text{عندما } V = 1 \text{ lit} = 10^{-3} \text{ m}^3 \Rightarrow n \approx 10^{10} \times 10^{-1} = 10^9$$


$$\text{عندما } V = 1 \text{ mm}^3 = 10^{-9} \text{ m}^3 \Rightarrow n \approx 10^{10} \times 10^{-3} = 10^7$$

تشير قيمة العدد الكمي الكبيرة إلى السويات العالية (ذات الطاقات العالية) وهي متراصة (أطرافها مستمرة).  
 كثافة سويات الطاقة:

كنا قد افترضنا أن مساقط العدد الكمي الرئيسي  $(n_x, n_y, n_z)$  متوضعة على أبعاد الحجرة الصندوقية  $(L_x, L_y, L_z)$ .  
 فإذا اعتبرنا الكرة التي نصف قطرها  $n$  [المعبر عن رقم السوية  $\epsilon(n)$  ذات السماكة  $d\epsilon$ ], كما هو موضح بالشكل ( )  
 فإنه يمكن التعبير عن كل نقطة من سطحها بدلالة المساقط بالعلاقة:

$$n = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}$$

ويكون عدد السويات  $N(\epsilon)$  المتوضعة داخل الحجرة (الواقعة في الربع الأول من الكرة) مساوياً لـ  $1/8$  العدد الكلي للسويات المتوضعة داخل الكرة (التي نصف قطرها  $n$ ).



شكل ( )

$$N(\epsilon) = \frac{1}{8} \left( \frac{4}{3} \pi n^3 \right) \quad (*)$$

وبما أن صيغة العدد الكمي الرئيسي بدلالة السوية والحجم هي:

$$\epsilon_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} n^2 \Rightarrow n^2 = \frac{8m}{h^2} \epsilon_n V^{2/3} \Rightarrow n = \frac{2(2m)^{1/2}}{h} (\epsilon_n)^{1/2} V^{1/3} \quad (**)$$

للحصول على عدد السويات  $N(\epsilon)$  المتوضعة داخل الكرة (تابع توزع السويات داخل الكرة) نعوض (\*\*\*) في (\*)  
 بعد إزالة الدليل  $n$  المتعلق بالسوية  $\epsilon_n$  بالشكل التالي:

$$N(\epsilon) = \frac{4}{3} \pi \frac{V}{h^3} (2m)^{3/2} (\epsilon)^{3/2} \quad (***)$$

وحيث أن التابع التوزع  $N(\epsilon)$  يعبر عن عدد السويات، فإن مفاضلته تعبر عن عدد السويات المتوضعة في المجال الطاقى  $[\epsilon, \epsilon + d\epsilon]$ . لذا نفرض تابع كثافة التوزع  $g(\epsilon)$  (الذي يساوي مشتقة التابع التوزع بالنسبة لـ  $\epsilon$ ) كما يلي:

$$\frac{dN(\epsilon)}{d\epsilon} = g(\epsilon) = 2\pi \frac{V}{h^3} (2m)^{3/2} (\epsilon)^{1/2} \Leftrightarrow dN(\epsilon) = g(\epsilon) d\epsilon$$

نستنتج مما سبق أن تابع كثافة التوزع  $g(\epsilon)$  يعبر عن كثافة التنضد أو درجة التحلل لحالات الانتقال المسموحة، ويأخذ الشكل:

$$g(\epsilon) = 2\pi CV (2m)^{3/2} (\epsilon)^{1/2} ; C = 1/h^3 \quad (5)$$

بالعودة للعلاقة (4) المعبرة عن عنصر فراغ الطاقة الطوري

$$d\Gamma(\epsilon) = 2\pi V (2m)^{3/2} (\epsilon)^{1/2} d\epsilon$$

نستنتج العلاقة التي تربط بين درجة التحلل وعنصر فراغ الطاقة الطوري بالشكل التالي:

$$\boxed{dN(\varepsilon) = g(\varepsilon) d\varepsilon = C d\Gamma(\varepsilon)} \quad (6)$$

- بالمشابهة: يمكن إيجاد عدد الدفوعات  $dN(P)$  المنتزعة في المجال  $[P, P + dP]$  وذلك بالتعويض في (\*\*\*) عن  $\varepsilon$  بقيمتها  $\varepsilon = P^2/2m$  والمفاضلة (واعتبار أن  $C = 1/h^3$ ) كما يلي:

$$N(P) = \frac{4}{3} \pi CV (2m)^{3/2} \frac{P^3}{(2m)^{3/2}} = \frac{4}{3} \pi CV P^3 \Rightarrow dN(P) = 4 \pi CV P^2 dP = g(P) dP$$

$$\boxed{g(P) = 4 \pi CV P^2} \quad (7)$$

بالعودة للعلاقة (2) المعبرة عن عنصر فراغ الاندفاع الطوري

$$d\Gamma(P) = 4\pi V P^2 dP$$

نستنتج العلاقة التي تربط بين درجة التحلل وعنصر فراغ الاندفاع الطوري بالشكل التالي:

$$\boxed{dN(P) = g(P) dP = C d\Gamma(P)} \quad (8)$$

- وأيضاً: يمكن إيجاد عدد السرعات  $dN(\mathcal{G})$  المنتزعة في المجال  $[\mathcal{G}, \mathcal{G} + d\mathcal{G}]$  وذلك بالتعويض في (\*\*\*) عن  $\varepsilon$  بقيمتها  $\varepsilon = m\mathcal{G}^2/2$  والمفاضلة (واعتبار أن  $C = 1/h^3$ ) كما يلي:

$$N(\mathcal{G}) = \frac{4}{3} \pi CV (2m)^{3/2} \frac{(m)^{3/2} \mathcal{G}^3}{(2)^{3/2}} = \frac{4}{3} \pi CV (2)^{3/2} (m)^{3/2} \frac{(m)^{3/2}}{(2)^{3/2}} \mathcal{G}^3$$

$$= \frac{4}{3} \pi CV m^3 \mathcal{G}^3 \Rightarrow dN(\mathcal{G}) = 4 \pi CV m^3 \mathcal{G}^2 d\mathcal{G} = g(\mathcal{G}) d\mathcal{G}$$

$$\boxed{g(\mathcal{G}) = 4 \pi CV m^3 \mathcal{G}^2} \quad (9)$$

بالعودة للعلاقة (3) المعبرة عن عنصر فراغ السرعة الطوري

$$d\Gamma(\mathcal{G}) = 4\pi V m^3 \mathcal{G}^2 d\mathcal{G}$$

نستنتج العلاقة التي تربط بين درجة التحلل وعنصر فراغ السرعة الطوري بالشكل التالي:

$$\boxed{dN(\mathcal{G}) = g(\mathcal{G}) d\mathcal{G} = C d\Gamma(\mathcal{G})} \quad (10)$$

### فرضيات الفيزياء الإحصائية: في الجملة المعزولة:

نفرض جملة معزولة مكونة من  $N$  جسيم موزعة على  $\varepsilon_i$  سوية طاقة ، بمعدل  $N_i$  جسيم في كل سوية.

- قانون انحفاظ عدد الجسيمات  $N$ : بما أن الجملة لا تتبادل الجسيمات مع الوسط الخارجي  $dN = 0$  فيبقى عدد جسيماتها ثابتاً  $N = cte$  . وتتوزع على سويات الطاقة المختلفة  $\varepsilon_i$  بمعدل  $N_i$  جسيم في كل سوية

$$dN=0 \Rightarrow N=cte \Leftrightarrow \boxed{N = \sum_i N_i}$$

$$\boxed{dN = \sum_i dN_i = 0} \quad \text{ويكون}$$

- قانون انحفاظ الطاقة الداخلية  $U$ : بما أن الجملة لا تتبادل العمل والحرارة مع الوسط الخارجي فنجد من المبدأ الأول في الترموديناميك:

$$\underbrace{\delta Q}_0 = dU + \underbrace{P dV}_0$$

$$\Rightarrow dU=0 \Rightarrow U=cte \Leftrightarrow \boxed{U = \sum_i N_i \varepsilon_i}$$

$$\boxed{dU = \sum_i \varepsilon_i dN_i = 0} \quad \text{ويكون}$$

- الوزن الإحصائي الإجمالي لـ  $n$  جملة مستقلة يساوي مجموع جداء الأوزان الإحصائية لهذه الجمل:

$$W_T = W_1 \times W_2 \times W_3 \times W_4 \times \dots \times W_n = \prod_{i=1}^n W_i$$

ويعبر الوزن الإحصائي للجملة الواحدة (الواقعة في حالة ماكروية محددة) عن عدد الحالات الميكروية (المجهرية) التي يمكن للجملة أن تأخذها، وتكون هذه الحالات متساوية الاحتمال.  
(لكافة الحالات الميكروية الممكنة - العائدة لحالة ماكروية محددة - نفس القيمة الاحتمالية).

- الأنتروبية الإجمالية  $S_T$  لـ  $n$  جملة مستقلة يساوي مجموع أنتروبيات هذه الجمل:

A	B
---	---

$$S_T = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n = \sum_{i=1}^n S_i$$

شكل ( )

البرهان: نفرض  $A$  و  $B$  جملتين مستقلتين ومفصولتين بحاجز كما بالشكل ( ).

وأن لكلٍ منهما أنتروبيته  $S_A$  و  $S_B$  ووزنها الإحصائي  $W_A$  و  $W_B$ .

بتطبيق قانون بولتزمان على كل جملة لحدة (قبل إزالة الحاجز):  $S_A = K \ln W_A$  و  $S_B = K \ln W_B$

وبعد إزالة الحاجز يصبح الوزن الإحصائي للجملة الجديدة  $W_T = W_A \times W_B$

وبتطبيق قانون بولتزمان على الجملة الجديدة (بعد إزالة الحاجز):

$$S_T = K \ln W_T = K \ln (W_A W_B) = K \ln W_A + K \ln W_B = S_A + S_B$$

- حالة التوازن الترموديناميكي: هي الحالة التي تقضي (ثمضي) فيها الجملة معظم الوقت (الحالة التي تكون فيها

أنتروبية الجملة أعظم ما يمكن  $(S_{max})$ . وإحصائياً: هي الحالة الماكروية التي يكون وزنها الإحصائي أعظماً

$W_{max}$  (عدد حالاتها الميكروية أكبر ما يمكن) وتدعى بالحالة الأكثر احتمالاً.

- الشرط الوحيد لتطبيق القوانين الإحصائية أن تكون الجمل المدروسة مكونة من عدد كبير جداً من الجسيمات.

**في الجملة المغلقة:** (باعتبارها تتبادل مع الوسط الخارجي الحرارة والعمل دون المادة)

يمكن اعتبار حالة التوازن الحالة التي يكون فيها الفقد في الطاقة في حدوده الدنيا (معدوم).

ويُعبّر عن ذلك بواسطة تابع هلمهولتز للطاقة الحرة  $F$ ، بالشكل  $F = F_{min}$ ، حيث  $F = U - TS$ .

وتفاضلياً:  $dF = -S dT - P dV$  فنجد  $F(T, V)$

**المبادئ الأساسية في العد:**

نميز في الجمل الترموديناميكية نوعين من الجسيمات: جسيمات كلاسيكية (متمايزة)،  $A, B, C, D, \dots$ ، تخضع

لإحصاء مكسويل - بولتزمان. وجسيمات كمية (غير متمايزة)، تخضع لإحصائي بوز - آينشتين أو فيرمي - ديراك.

التي سنتناولها بالتفصيل في حينها. كما سنتطرق لإحصاء جيبس عند دراسة الجمل المفتوحة.

- لمعرفة عدد الحالات **الماكروية** الإجمالي  $N_o$ ، الناتج عن توزيع  $N$  جسيم **(متمايز أو غير متمايز)** على  $N_\epsilon$

سوية نستخدم العلاقة الإحصائية التالية:

$$N_o = \frac{(N + N_\epsilon - 1)!}{N!(N_\epsilon - 1)!}$$

**مثال:** عدد طرق توزيع  $N = 3$  جسيم على  $N_\epsilon = 2$  سوية طاقة.  $N_o = \frac{(3 + 2 - 1)!}{3!(2 - 1)!} = \frac{4!}{3!1!} = 4$

نعبر عن توزيع الجسيمات على السويات (عند كل حالة ماكروية) بالشكل التالي:  $(N_1, N_2)$

فنكتب هذه الحالات بالشكل التالي:  $\{(3,0), (0,3), (2,1), (1,2)\}$ .

- لمعرفة عدد الحالات **الميكروية** الإجمالي  $N_o$ ، الناتج عن توزيع  $N$  جسيم **متمايز** على  $N_\epsilon$  سوية غير متحللة

نستخدم العلاقة الإحصائية التالية:

$$W \equiv N_o = (N_\epsilon)^N$$

وإذا كانت إحدى السويات متحللة لعدد  $N_g$  من الخلايا فنحسب عدد حالات التوزيع داخل السوية على الخلايا بالعلاقة

$$W \equiv N_o = (N_g)^N$$

**مثال:** عدد طرق توزيع  $N = 3$  جسيم متمايز  $\{A, B, C\}$  على  $N_\epsilon = 2$  سوية طاقة.  $N_o = (N_\epsilon)^N = 2^3 = 8$

$$\left\{ \underbrace{(ABC, -)}_{(3,0)}, \underbrace{(-, ABC)}_{(0,3)}, \underbrace{(A, BC)}_{(1,2)}, \underbrace{(B, AC)}_{(1,2)}, \underbrace{(C, AB)}_{(1,2)}, \underbrace{(AB, C)}_{(2,1)}, \underbrace{(AC, B)}_{(2,1)}, \underbrace{(BC, A)}_{(2,1)} \right\}$$

- لمعرفة عدد الحالات **الميكروية** الإجمالي  $N_o$ ، الناتج عن **التوزيع المسبق** لـ  $N$  جسيم **متمايز** على  $N_\epsilon$  سوية

بالشكل  $(N_{\epsilon_1}, N_{\epsilon_2}, N_{\epsilon_3}, \dots)$  نستخدم العلاقة الإحصائية التالية:

$$W \equiv N_o = \frac{N!}{\prod_i N_{\varepsilon_i}!} = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}! N_{\varepsilon_3}! \dots}$$

مثال: عدد طرق توزيع  $N=3$  جسيم متمايز  $\{A,B,C\}$  موزعة على  $N_{\varepsilon} = 2$  سوية طاقة بشكل مسبق على

النحو التالي:  $(\overset{\varepsilon_1}{3}, \overset{\varepsilon_2}{0})$ ، ثم  $(\overset{\varepsilon_1}{2}, \overset{\varepsilon_2}{1})$ ، ثم  $(\overset{\varepsilon_1}{1}, \overset{\varepsilon_2}{2})$ .

$$\begin{aligned} (\overset{\varepsilon_1}{3}, \overset{\varepsilon_2}{0}) &\Rightarrow N_o = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}!} = \frac{3!}{3!0!} = 1 \Leftrightarrow \left\{ \underbrace{(\overset{\varepsilon_1}{ABC}, \overset{\varepsilon_2}{-})}_{(3,0)} \right\} \\ (\overset{\varepsilon_1}{2}, \overset{\varepsilon_2}{1}) &\Rightarrow N_o = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}!} = \frac{3!}{2!1!} = 3 \Leftrightarrow \left\{ \underbrace{(\overset{\varepsilon_1}{AB}, \overset{\varepsilon_2}{C})(\overset{\varepsilon_1}{AC}, \overset{\varepsilon_2}{B})(\overset{\varepsilon_1}{BC}, \overset{\varepsilon_2}{A})}_{(2,1)} \right\} \\ (\overset{\varepsilon_1}{1}, \overset{\varepsilon_2}{2}) &\Rightarrow N_o = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}!} = \frac{3!}{1!2!} = 3 \Leftrightarrow \left\{ \underbrace{(\overset{\varepsilon_1}{A}, \overset{\varepsilon_2}{BC})(\overset{\varepsilon_1}{B}, \overset{\varepsilon_2}{AC})(\overset{\varepsilon_1}{C}, \overset{\varepsilon_2}{AB})}_{(1,2)} \right\} \end{aligned}$$

يمكن للطالب مقارنة النتائج.

مثال: جملة معزولة، درجة حرارتها  $T(k^o)$  ثابتة، مكونة من جسيما متمايزان A و B. يوزعان على ثلاث

سويات للطاقة، بحيث تبقى طاقتها الداخلية ثابتة  $U = 4\varepsilon_o$ ، حيث  $\varepsilon_o = KT$  (J)

فإذا علمت أن طاقة هذه السويات هي:  $\varepsilon_1 = \varepsilon_o$  و  $\varepsilon_2 = 2\varepsilon_o$  و  $\varepsilon_3 = 3\varepsilon_o$ .

وأن درجات تحلل هذه السويات هي:  $g(\varepsilon_1) = 1$  و  $g(\varepsilon_2) = 2$  و  $g(\varepsilon_3) = 1$ . والمطلوب:

أوجد حالات التوزيع الماكروي الممكنة (المحققة لشرط ثبات الطاقة الداخلية). ثم أوجد (مع التمثيل) عدد

حالات التوزيع الميكروي (الموافقة لكل حالة توزيع ماكروي ممكن)، أي الوزن الإحصائي  $W$ .

ثم أوجد حالة التوازن (من بين حالات التوزيع الماكروي الممكنة).

الحل: نوجد العدد الإجمالي لحالات التوزيع الماكروي، ثم ننتخب منها الحالات الممكنة فقط (المحققة للشرط).

$$N_o = \frac{(N + N_{\varepsilon} - 1)!}{N!(N_{\varepsilon} - 1)!} = \frac{(2 + 3 - 1)!}{2!(3 - 1)!} = \frac{4!}{2!2!} = 6 \quad (\text{العدد الإجمالي لحالات التوزيع الماكروي})$$

نمثل توزيع الجسيمات على السويات عند كل حالة ماكروية بالشكل التالي:  $(\overset{\varepsilon_1}{N_1}, \overset{\varepsilon_2}{N_2}, \overset{\varepsilon_3}{N_3})$

$$\left\{ \underbrace{(2,0,0)}_{NO}, \underbrace{(0,2,0)}_{OK}, \underbrace{(0,0,2)}_{NO}, \underbrace{(0,1,1)}_{NO}, \underbrace{(1,0,1)}_{OK}, \underbrace{(1,1,0)}_{NO} \right\}$$

نلاحظ أن كل حالة تحقق شرط ثبات العدد الإجمالي  $N = \sum_i N_i = 3$

لإيجاد حالات التوزيع الماكروي المحققة لشرط ثبات الطاقة الداخلية  $U = 4\varepsilon_o$  نطبق قانون انحفاظ الطاقة

الداخلية  $U = \sum_i N_i \varepsilon_i$  على كل حالة من حالات التوزيع الماكروي الستة. ثم نوجد الوزن الإحصائي  $W$

للحالات المقبولة فقط (المحققة للشرط)، بتطبيق قواعد التوزيع السابقة. ونمثلها، كما يلي:


$$U_{(2,0,0)} = 2\varepsilon_o + 0 + 0 = 2\varepsilon_o \neq 4\varepsilon_o \Rightarrow NO \text{ مرفوضة}$$

$$U_{(0,2,0)} = 0 + 2 \times 2\varepsilon_o + 0 = 4\varepsilon_o \Rightarrow OK \text{ مقبولة}$$

بتطبيق قاعدة توزيع  $N$  جسيم متمايز في السوية الثانية على  $g = 2$  خلية  $(N_{g1}, N_{g2})$  لأن الخلية الثانية متحللة

$$W \equiv N_o = (N_g)^N = 2^2 = 4$$

وتمثيلها بالشكل:



(هذه الحالات متساوية الاحتمال)

$$U_{(0,0,2)} = 0 + 0 + 2 \times 3\varepsilon_o = 6\varepsilon_o \neq 4\varepsilon_o \Rightarrow \text{مرفوضة NO}$$


$$U_{(0,1,1)} = 0 + 1 \times 2\varepsilon_o + 1 \times 3\varepsilon_o = 5\varepsilon_o \neq 4\varepsilon_o \Rightarrow \text{مرفوضة NO}$$

$$U_{(1,0,1)} = 1 \times \varepsilon_o + 0 + 1 \times 3\varepsilon_o = 4\varepsilon_o \Rightarrow \text{مقبولة OK}$$

بتطبيق قاعدة التوزع المسبق لـ  $N$  جسيم متمايز

$$W \equiv N_o = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}! N_{\varepsilon_3}!} = \frac{2!}{1! 0! 1!} = 2$$

وتمثيلها بالشكل:



(هذه الحالات متساوية الاحتمال)

$$U_{(1,1,0)} = 1 \times \varepsilon_o + 1 \times 2\varepsilon_o + 0 = 3\varepsilon_o \neq 4\varepsilon_o \Rightarrow \text{مرفوضة NO}$$

حالة التوازن: هي الحالة الماكروية الموافقة لأكثر عدد من الحالات الميكروية (ذات الوزن الإحصائي الأعظمي) لأنها تكافئ القول بأنها الحالة التي تمضي فيها الجملة معظم الوقت. وفي مثالنا تكون الحالة (0,2,0) حالة توازن.

ملاحظة: إذا صدف وكان يوجد أكثر من حالة واحدة بنفس الوزن الإحصائي، فنأخذ من بينهم تلك ذات الطاقة الداخلية الأقل.

كرر المثال السابق عندما لا تكون السوية الثانية متحللة، أي:  $g(\varepsilon_1) = 1$  و  $g(\varepsilon_2) = 1$  و  $g(\varepsilon_3) = 1$ .

### الطاقم:

نعلم أن الوزن الإحصائي  $W$  لإحدى حالات التوزع الماكروي يعبر عن عدد الحالات الميكروية (المجهرية) للجملة. بفرض  $W_i$  الوزن الإحصائي لإحدى حالات التوزع الماكروي الممكنة للجملة، حيث  $i = 1, 2, \dots, M$  نحسب أنتروبية حالة التوزع الماكروية  $i$  من قانون بولتزمان  $S_i = K \ln W_i$ .

فيكون الوزن الإحصائي للطاقم (جميع حالات التوزع الماكروي الممكنة للجملة)  $\Omega = \sum_{i=1}^M W_i$ .

ونحسب أنتروبية الطاقم من قانون بولتزمان  $S_\Omega = K \ln \Omega = K \ln \sum_{i=1}^M W_i$ .

مثال: جملة معزولة مكونة من  $N$  جسيم متمايز موزعة على ثلاث سويات للطاقة (غير متحللة) بحيث تبقى طاقتها

الداخلية ثابتة  $U = 2\varepsilon$ . تعطى طاقة السويات بالعلاقة:  $\varepsilon_i = i\varepsilon$  ;  $i = 0, 1, 2$ . والمطلوب:

1- من أجل  $N = 2$ ، أوجد حالات التوزع الماكروي الممكنة، واحسب  $W$  وأنتروبية كل منها، وأنتروبية الطاقم.

2- كرر الطلب الأول من أجل  $N = 3$  وذلك بشرط أن يقع جسيم على الأقل في السوية  $\varepsilon_o = 0$ . ماذا تستنتج؟

الحل: 1- من أجل  $N = 2$  أي (A,B)،

$$N_o = \frac{(N + N_\varepsilon - 1)!}{N!(N_\varepsilon - 1)!} = \frac{(2 + 3 - 1)!}{2!(3 - 1)!} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

عدد الحالات الماكروية الإجمالي:

$$\left\{ \begin{array}{l} \overbrace{(2,0,0)}^{U=0} \quad \overbrace{(0,2,0)}^{U=2\varepsilon} \quad \overbrace{(0,0,2)}^{U=4\varepsilon} \quad \overbrace{(1,1,0)}^{U=\varepsilon} \quad \overbrace{(1,0,1)}^{U=2\varepsilon} \quad \overbrace{(0,1,1)}^{U=3\varepsilon} \end{array} \right\}$$

حالات التوزع الماكروي الإجمالي

والممكنة منها  $\{(0,2,0), (1,0,1)\}$ . نوجد  $W$  و  $S$  لكلٍ منها باتباع طريقة التوزع المسبق.

$$W_{(0,2,0)} = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}! N_{\varepsilon_3}!} = \frac{2!}{0! 2! 0!} = 1 \quad \overline{\overline{\text{AB}}} \Rightarrow S_{(0,2,0)} = K \ln W_{(0,2,0)} = K \ln 1 = 0$$

$$W_{(1,0,1)} = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}! N_{\varepsilon_3}!} = \frac{2!}{1! 0! 1!} = 2 \quad \frac{\overline{A}}{\overline{B}} \quad \frac{\overline{B}}{\overline{A}} \Rightarrow S_{(1,0,1)} = K \ln W_{(1,0,1)} = K \ln 2$$

$$\Omega_{N=2} = \sum_{i=1}^M W_i = W_{(0,2,0)} + W_{(1,0,1)} = 3 \quad \text{نوجد الوزن الإحصائي للطاقم من أجل } N=2 \text{ بتطبيق العلاقة}$$

$$S_{\Omega}(N=2) = K \ln \Omega_{N=2} = K \ln 3 \quad \text{نوجد أنتروبية الطاقم من أجل } N=2 \text{ بتطبيق العلاقة}$$

-2- من أجل  $N=3$  أي  $(A,B,C)$

$$N_o = \frac{(N + N_{\varepsilon} - 1)!}{N!(N_{\varepsilon} - 1)!} = \frac{(3+3-1)!}{3!(3-1)!} = \frac{5!}{3!2!} = 10 \quad \text{عدد الحالات الماكروية الإجمالي:}$$

حالات التوزيع الماكروي الإجمالي

$$\left\{ \begin{array}{cccccccccc} \overbrace{(3,0,0)}^{U=0} & \overbrace{(0,3,0)}^{U=3\varepsilon} & \overbrace{(0,0,3)}^{U=6\varepsilon} & \overbrace{(2,1,0)}^{U=\varepsilon} & \overbrace{(2,0,1)}^{U=2\varepsilon} & \overbrace{(1,2,0)}^{U=2\varepsilon} & \overbrace{(1,0,2)}^{U=4\varepsilon} & \overbrace{(0,2,1)}^{U=4\varepsilon} & \overbrace{(0,1,2)}^{U=5\varepsilon} & \overbrace{(1,1,1)}^{U=3\varepsilon} \end{array} \right\}$$

والممكنة منها  $\{(2,0,1), (1,2,0)\}$ . نوجد  $W$  و  $S$  لكلٍ منها باتباع طريقة التوزيع المسبق.

$$W_{(2,0,1)} = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}! N_{\varepsilon_3}!} = \frac{3!}{2! 0! 1!} = 3$$

$$\Rightarrow S_{(2,0,1)} = K \ln W_{(2,0,1)} = K \ln 3$$

$$\begin{array}{ccc} \overline{C} & \overline{B} & \overline{A} \\ \hline \overline{AB} & \overline{AC} & \overline{BC} \end{array}$$

$$W_{(1,2,0)} = \frac{N!}{N_{\varepsilon_1}! N_{\varepsilon_2}! N_{\varepsilon_3}!} = \frac{3!}{1! 2! 0!} = 3$$

$$\Rightarrow S_{(1,2,0)} = K \ln W_{(1,2,0)} = K \ln 3$$

$$\begin{array}{ccc} \overline{BC} & \overline{AC} & \overline{AB} \\ \hline \overline{A} & \overline{B} & \overline{C} \end{array}$$

$$\Omega_{N=3} = \sum_{i=1}^M W_i = W_{(2,0,1)} + W_{(1,2,0)} = 6 \quad \text{نوجد الوزن الإحصائي للطاقم من أجل } N=3 \text{ بتطبيق العلاقة}$$

$$S_{\Omega}(N=3) = K \ln \Omega_{N=3} = K \ln 6 \quad \text{نوجد أنتروبية الطاقم من أجل } N=3 \text{ بتطبيق العلاقة}$$

$$\frac{\Omega_{N=3}}{\Omega_{N=2}} = \frac{6}{3} = 2 \quad \text{نستنتج أن: نسبة الأوزان الإحصائية للطواقم}$$

$$\frac{S_{\Omega}(N=3)}{S_{\Omega}(N=2)} = \frac{K \ln 6}{K \ln 3} = \frac{\ln 6}{\ln 3} \quad \text{النسبة بين أنتروبيتي الطاقمين}$$



مكتبة A to Z