



كلية العلوم

القسم : علم الحياة

السنة : الرابعة

المادة : جراثيم وفيروسات

المحاضرة : الاولى / نظري / د.مرسال

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z Facebook Group :

كلية العلوم

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

2026

6

# بيولوجيا الجراثيم والفيروسات

## المحاضرة النظرية الأولى تقسيم الأحياء الدقيقة

### تقسيم الأحياء الدقيقة:

بناء على التركيب الداخلي للخلايا تمّ تقسيم الأحياء الدقيقة إلى مجموعتين كبيرتين:

١- prokaryote الأوليات الدنيا وتضم البكتيريا Bacteria مفردها Bacterium والأشنيات الزرقاء المخضرة cyanobacteria

٢- eukaryote الأوليات العليا وتضم الفطور Fungi مفردها Fungus والخمائر Yeasts والطحالب والأشنيات Algae مفردها Alga والبروتوزوا Protozoa.

اللاحقة pro من اللاتينية تعني قبل و caryo تعني نواة، بالتالي الـ prokaryote هي أحياء دقيقة خلاياها لا تملك نواة واضحة (مورثات ضمن نواة غير محاطة بغشاء نووي)، أما الـ eukaryote فهي أحياء دقيقة تملك نواة واضحة (محاطة بغشاء نووي)، وهي ذات حجم أكبر و تركيب أكثر تعقيدا من الـ prokaryote، كما أنها تحتوي على ميتوكوندريّة.

# أبعاد الأحياء الدقيقة


- يدل اسمها على أنها صغيرة جداً، فبالنسبة لـ prokaryote يتراوح عرضها من ٠,٥ إلى ٥ ميكرون، أطوالها مختلفة وهي غير مرئية للعين المجردة التي تميز حتى ١٠٠ ميكرون (٠,١ مم). مثال: بكتيريا *E. coli* هي بكتيريا عصوية تعتبر ذات حجم متوسط حيث يبلغ طولها من ٢ إلى ٦ ميكرون وعرضها ١,٥ ميكرون
- نميز شكلين أساسيين للأحياء الدقيقة التي تنتمي إلى هذه المجموعة:
  - أحياء كروية الشكل cocci مفردتها coccus حيث تتواجد إما بشكل فردي أو تتجمع على شكل عنقودي *Staphylococcus* أو على شكل سلسلة طويلة *Streptococcus*،
  - أحياء عصوية الشكل Bacilli مفردتها Bacillus وهي تتواجد إما بشكل أحادي أو سلسلة قصيرة أو طويلة. أو بشكل عصوي ملتوي أو حلزوني أو لولبي.
- أما بالنسبة لـ eukaryote فيتراوح عرضها من ٢ إلى ٢٠٠ ميكرون وأطوالها مختلفة. فالتحالب هي مرئية للعين المجردة.

## بعض أشكال للبكتيريا

- أ- كروية فردية Coccus
- ب- كروية ثنائية Diplococcus
- ج- كروية رباعية Tetrad
- د - كروية مكعبة Sarcina
- هـ- كروية عقدية Streptococcus
- و- كروية عنقودية Staphylococcus
- 
- أ - عصوية فردية Monobacillus
- ب - عصوية ثنائية Diplobacillus
- أو سبحية Streptobacillus
- 
- هـ - حلزونية Spirillum
- و- لولبية Spiral
- ل - ضمية واوية Vibrio
- م - منتئية Spirochete
-




coccus




diplococcus




streptococcus




tetrad




staphylococcus



sarcina




المكورات العنقودية




المكورات السبحية


هـ - حلزونية Spirillum  
و- لولبية Spiral



أ - عصوية فردية Monobacillus  
ب - عصوية ثنائية Diplobacillus  
أو سبحية Streptobacillus




ضمية واوية Vibrio  
م - منتثية Spirochete



## الجراثيم الشعاعية Actinobacteria (Actinomycetes)

- أحياء دقيقة تأخذ من صفات البكتريا والفطور وتنتشر في التربة والماء. تكون خيوطا رفيعة-هيفات- تشكل مشيخة.
- تشابه الفطريات في خاصية التفرع الكثير مشكلة مشيخة هوائية وأبواغ كونيديية. ولا تشكل عكارة في الوسط الغذائي السائل فتظل ككتل متجمعة او كريات صغيرة مميزة.
- تشابه الجراثيم في أن بعض أجناسها يحمل سيطا، وفي تركيب الجدار الخلوي وحساسيتها تجاه المواد المثبطة للجراثيم وليس للفطريات، وتعد من بدائيات النوى.



## الجراثيم الشعاعية (Actinomycetes)


### مراحل نمو البكتيريا

- ١- الطور اللاجي -التكيف- Lag phase**  
يبدأ هذا الطور من بدء التلقيح وفي هذا الطور لا تنقسم الخلايا أو تنقسم ببطء شديد. تزداد البكتيريا في الحجم ويزداد تنفسها وتمثيلها الغذائي ويظهر البروتوبلازم متجانس.
- ٢- الطور اللوغاريتمي Logarithmic**  
في هذا الطور يكون لوغاريتم العدد مع الزمن خطأ مستقيماً - تصل سرعة التكاثر إلى أقصاها - عمر الجيل ثابتاً - الخلايا صغيرة الحجم ويبقى البروتوبلازم متجانساً وقرب نهايته تظهر الحبيبات في البروتوبلازم.
- ٣- طور الثبات Stationary phase**  
عند نهاية الطور اللوغارتمي يتباطأ معدل التكاثر حتي يصبح عدد البكتيريا في المزرعة ثابت تقريباً . وبذلك تكون الخلايا الجديدة المتكونة مساوية لعدد الخلايا الميتة . تظهر الخلايا متجانسة الحجم والشكل وتبدأ المواد المخزنة في الظهور بوضوح كما تظهر الجراثيم في الأنواع المتجترمة .
- ٤- طور الهبوط Decline phase**  
يزداد معدل موت الخلايا عن معدل تكاثرها ويصبح معدل الموت لوغارتميا وبعد طور الهبوط تموت كل الخلايا في فترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة سنوات حسب نوع البكتيريا ثم تتحلل ذاتيا نتيجة لنشاط الانزيمات التي بداخلها . وفي هذا الطور تظهر الخلايا بأشكال غريبة غير منتظمة وغير متجانسة في الحجم أو الشكل وتنفرد الجراثيم من الخلايا .

## منحني نمو البكتيريا Growth Curve

لا تتكاثر كل البكتيريا بسرعة واحدة حيث يختلف عمر الجيل (Generation time) (الفترة التي تمر بين إنقسامين متتاليين) من نوع لآخر حيث يتراوح ما بين ٢٠-٣٠ دقيقة وفي الأنواع البطيئة يتراوح ما بين ٥-٦ ساعات . وعند عمل منحني نمو Growth curve (وهو العلاقة بين لوغارتيم عدد الميكروبات على المحور العمودي والزمن على المحور الافقي) تظهر أربعة أطوار وهي.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Lag phase        | (١) الطور اللاجي (طور الركود) |
| Logarithmic      | (٢) طور النمو اللوغارتمي      |
| Stationary phase | (٣) الطور الثابت              |
| Decline phase    | (٤) طور الهبوط                |



### - تفسير المراحل

#### مرحلة التكيف (الركود)

عندما تُنقل بكتيريا إلى وسط غذائي جديد، فإنها لا تتكاثر بشكل فوري إنما تمر بمرحلة تأقلم تسمى الركود أو المكوث . تنتج البكتيريا في هذه المرحلة الانزيمات المناسبة من أجل استغلال مصادر الغذاء الجديدة . وتنتج المواد المطلوبة لنموها كالزلاليات والحوامض النووية . تستمر هذه المرحلة حتى تصل البكتيريا إلى درجة إنها تستطيع الانقسام . ويتوقف ذلك على كمية الجراثيم المزروعة وعمر ونوع المزرعة الجرثومية وطبيعة الوسط المغذي.

#### مرحلة النمو الأسّي

تنقسم البكتيريا بوتيرة ثابتة ، ويتضاعف عددها في كل جيل . توصف هذه المرحلة بالرسم على شكل خط متعامد بشكل حاد . تستمر هذه المرحلة ما دامت شروط التنمية مناسبة .

#### مرحلة الثبات

بسبب زيادة كثافة البكتيريا تسوء ظروف التنمية ، تتناقص المواد الغذائية وتصبح عاملاً محدداً. يضاف إلى ذلك تراكم إفرازات مواد سامة في الوسط الغذائي، الأمر الذي قد يغير من درجة ال-pH . وفي أعقاب ذلك تقل وتيرة تكاثر البكتيريا ويموت بعضها . في هذه المرحلة يكون عدد البكتيريا الناتجة مساوياً لعدد الوفيات (البكتيريا الميتة). لذا يبقى حجم العشيرة ثابتاً. يتمثل ذلك بخط مستقيم بالرسم .

#### مرحلة الموت

تسوء ظروف البيئة أكثر وأكثر، وتيرة الوفاة تكون أعلى من وتيرة الانقسامات وتبدأ أعداد البكتيريا بالانخفاض .

## تصنيف البكتريا

- يقوم تصنيف البكتريا بناء على عدة عوامل منها:
- المواصفات الشكلية: شكل الخلية (كروي، عصوي، حلزوني، ملتوي...)، لون المستعمرات التي تشكلها، بنية وتركيب الخلية (خصائص الجدار الخلوي، مكتنفات الخلية، نوعية الأنزيمات، وجود الكبسولة، وجود السياط...)، تشكيل الأبواغ، طرق التكاثر، طرق التنفس (هوائي، لا هوائي، لا هوائي اختياري)، امتلاك أنزيم الكتلاز الذي يفكك الماء الأوكسجيني  $H_2O_2$ ، طريقة التخمر (متماثل أو غير متماثل التخمر)، نوعية التغذية (ذاتي أو غير ذاتي التغذية)، نوعية منتجات الاستقلاب، الاختلافات الوراثية،...


## التغذية:

- كل الأحياء الدقيقة بحاجة إلى الماء و إلى مصدر للكربون ومصدر للآزوت و إلى العناصر المعدنية. حوالي 95% من الوزن الجاف للخلية البكتيرية مكون من عناصر الكربون والأوكسجين والهيدروجين والآزوت بشكل أساسي، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيزيوم والحديد. من هذه العناصر تقوم الخلية ببناء البروتينات والكربوهيدرات والدهون والحموض النووية اللازمة لنموها وتطورها وتكاثرها.
- يعتبر الكربون عنصر بالغ الأهمية للخلية الحية، فهو ضروري لبناء هيكل الخلية وجميع مكوناتها، ويشكل حوالي 50% من الوزن الجاف للخلية.
- يستخدم عنصر الآزوت لبناء الأحماض الأمينية وبعض المركبات الكربوهيدراتية والدمسة و المرافقات الأنزيمية.
- كما يستخدم عنصر الفوسفور لبناء الأحماض النووية والفوسفوليبيدات والنيكليوتيدات وبعض المرافقات الأنزيمية والبروتينات و المكونات الخلوية.
- يدخل الكبريت في بناء بعض الأحماض الأمينية والفيتامينات.
- يعتبر عنصر البوتاسيوم ضرورياً لنشاط الأنزيمات، وعنصر الكالسيوم يساهم في مقاومة الخلية للحرارة، أما المغنيزيوم فهو مرافق للعديد من الأنزيمات، ويساهم في ثبات واستقرار الريبوزوم والأغشية الخلوية، ويدخل الحديد أيضاً كمرافق للأنزيمات و نواقل الإلكترونات.
- تحتاج الخلايا أيضاً إلى كميات قليلة جداً تقدر بالميكروغرام من العناصر النادرة مثل: المنغنيز، النحاس، النيكل، الكوبالت، التوتياء.. تحتاج الخلايا أيضاً إلى محفزات للنمو مثل: الحموض الأمينية، الفيتامينات...

# بناء على ما سبق يمكن تقسيم البكتيريا من حيث طريقة التغذية إلى طرازين مختلفين:

- - بكتيريا ذاتية التغذية Autotrophs :
- وهذا النوع من البكتيريا بإمكانه توفير احتياجاته الكربونية من مصادر غير عضوية باستعمال ثاني أكسيد الكربون الجوي ومن هنا فهي تعيش مستقلة غير معتمدة على غيرها.
- ويوجد نوعان من البكتيريا ذاتية التغذية هما:
- بكتيريا ذاتية التغذية ضوئية Photoautotrophs :
- هذا النوع يستخدم الطاقة الضوئية مثله مثل باقي النباتات الخضراء وهي قلة بين البكتيريا غالباً ما يكون لونها أخضر أو أحمر أو أرجواني وذلك لاحتوائها على نوع خاص من الكلوروفيل البكتيري.

- ينتمي إلى هذه المجموعة بكتيريا الكبريت الخضراء، حيث تمثل  $CO_2$  كمصدر وحيد للكربون بوجود الضوء وفق مايلي:



- بكتيريا ذاتية التغذية كيميائية Chemoautotrophs :
- لا تحتوي هذه النوعية على الكلوروفيل و بالتالي لا يمكنها استخدام الضوء كمصدر للطاقة ولكنها تقوم بأكسدة بعض المواد الكيميائية اللاعضوية وتستغل الطاقة الناتجة في تمثيل ثاني أكسيد الكربون وبناء احتياجاتها.
- مثال بكتيريا النيتريت Nitrite bacteria.



# بكتيريا متغايرة التغذية ( عضوية التغذية )

## : Heterotrophs

- هذا النوع يتطلب مركبات عضوية معقدة من النتروجين والكربون من أجل التمثيل الغذائي. ولا تستطيع هذه النوعية من البكتيريا أن تعيش مستقلة حيث لا يمكنها الاعتماد على نفسها في صنع وتكوين احتياجاتها ولذلك فهي تعتمد على غيرها من الكائنات الأخرى من نباتات أو حيوان أو إنسان و تستمد منه المواد الكربوهيدراتية بصورة جاهزة. ومنها البكتيريا التي تعيش متطفلة Parasitic ، أو بشكل رمي Saprophytic ، أو متكافلة Symbiotic.
- تحصل هذه البكتيريا على الطاقة من خلال أكسدة المواد العضوية

## تصنيف البكتيريا وفق درجة تسامحها مع الأوكسجين :

- ١ - البكتيريا الهوائية الإجبارية Strict Aerobic Bacteria: لا تستطيع النمو في غياب الأوكسجين من أمثلتها *Pseudomonas, Acetobacter*.
- ٢ - البكتيريا اللاهوائية الإجبارية Strict Anaerobic Bacteria: لا تستطيع النمو بوجود الأوكسجين من أمثلتها *Pediococcus parvulus, Clostridium*.
- ٣ - البكتيريا الهوائية أو اللاهوائية الاختيارية Facultatif Aerobic or Anaerobic Bacteria: وهي قادرة على النمو والتطور بوجود أو غياب الأوكسجين، مع تفضيل أحد الخيارين من أمثلتها *Leuconostoc mesenteroides, Escherichia coli, Listeria*.
- ٤ - البكتيريا شحيحة الحاجة للأوكسجين Microaerophilic Bacteria: لا تتحمل التراكيز العالية من الأوكسجين وإنما تنمو جيداً بوجود التراكيز المنخفضة منه. من أمثلتها *Helicobacter, Campylobacter, Lactococcus lactis* و *Spirillum*
- ٥ - البكتيريا المتسامحة مع التراكيز المرتفعة من الأوكسجين Aerotolerant Bacteria: تتسامح مع وجود تركيز للأوكسجين يبلغ ٢٠% ولكنها لا تستخدم الأوكسجين في عملية الاستقلاب مثل بكتيريا العصيات اللبنية *Lactobacillus*.



*Escherichia coli*



*Salmonella*